



“太极杯” 执业药师职业技能竞赛

专业基础知识库

(执业中药师篇)

竞赛执委会赛项组制

2025 年 5 月 8 日

说 明

1.本次竞赛专业基础知识题库（初赛）共包含 900 道题，其中药事管理法规 200 道、中药学专业知识 600 道、药物治疗与慢病管理 100 道，题型包括单选题、多选题。

2.初赛将通过扫码线上答题的方式进行，竞赛执委会赛项组将从题库中抽取 50 道考题，另补充 10 道库外考题，共计 60 道题目，其中单选 50 道，多选 10 道，限时完成。

3.请大家认真学习备赛，积极参赛，赛出水平，赛出风格。

第一部分 药事管理与法规 (200 题)

一、单选题

1.下列药品零售企业的行为,不属于违反《药品经营质量管理规范》规定的是 (D)

- A.注册在某药品零售企业的执业药师,其实际工作单位为某药品批发企业
- B.某药品零售企业通过程序插件,将其阴凉陈列区的温度监测设备显示数值定在19℃
- C.某药品零售企业购进药品不索取发票,且未配备执业药师,依然开展处方销售活动
- D.某药品零售企业制作了提示牌“按照药品 GSP 的规定,非质量问题,药品一经售出,不得退换”,并将其摆放于店内醒目位置
- E.某药品零售企业拆零销售药品时无需保留原包装及说明书

2.下列不属于药品质量特性的是 (D)

- A.有效性
- B.安全性
- C.稳定性
- D.两重性
- E.均一性

3.疫苗生产企业的销售记录应保存的期限为超过疫苗有效期后 (B)

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

4.企业委托运输药品应当有记录,运输记录中不包含的是 (B)

- A.发货时间
- B.收货时间
- C.药品件数
- D.委托经办人
- E.承运单位

5.下列既属于医疗用毒性药品,又属于孕妇慎用的是 (B)

- A.麝香
- B.蟾酥
- C.甘遂
- D.红粉
- E.乌梢蛇

6.依据《中国药典》(2020 版)规定,某药品经营企业到到货的 1600 件同一批号的当归进行抽样检查,至少应抽样检 (D)

- A.53 件
- B.54 件
- C.55 件
- D.56 件
- E.57 件

7.从事中药材、中药饮片验收工作的人员学历或职称要求是 (D)

- A.药学专业中专以上学历或具有药学初级以上专业技术职称
- B.药学专业大专以上学历或具有药学中级以上专业技术职称
- C.中药学专业中专以上学历或具有中药学初级以上专业技术职称
- D.中药学专业中专以上学历或具有中药学中级以上专业技术职称

E. 中药学专业本科以上学历或具有中药学高级以上专业技术职称

8.直接收购地产中药材的，验收人员的学历或职称要求是 (D)

A. 中药专业中专以上学历

B.高中以上学历

C. 中药学初级以上专业技术职称

D. 中药学中级以上专业技术职称

E. 中药专业大学专科以上学历

9.依据《药品经营质量管理规范》，药品按批号堆码，不同批号的药品不得混垛，垛间距不小于 (B)

A.3 厘米 B.5 厘米 C. 10 厘米 D.20 厘米 E.30 厘米

10.依据《药品经营质量管理规范》，平面仓库测点终端安装的位置，不得低于药品货架或药品堆码垛高度的 (C)

A. 1/2 B.1/3 C.2/3 D.1/4 E.3/5

11.医疗用毒性药品的标识为 (D)

A.白底黑字 B.白底绿字

C.白底红字 D.黑底白字

E.白底蓝字

12.药品储存实行色标管理，其黄色区为 (C)

A.合格品区、零货称取区 B.待发药品区、待验药品区

C.待验药品区、退货药品区 D.待发药品区、退货药品区

E.退货药品区、不合格药品区

13. 以下批准证明文件有效期不是 5 年的是 (A)

A.进口药材批件 B.进口药品注册证

C.药品经营许可证 D.医疗机构制剂许可证

E.药品生产许可证

14.系统应自动对药品储存运输过程中的温湿度环境进行不间断监测和记录，以下说法错误的是 (B)

A.系统应至少每隔 1 分钟更新一次测点温湿度数据

B.在药品储存过程中至少每隔 1 小时自动记录一次实时温湿度数据

C.在运输过程中至少每隔 5 分钟自动记录一次实时温度数据

D. 当监测的温湿度值超出规定范围时，系统应至少每隔 2 分钟记录一次实时温湿度数据

E. 当发生供电中断的情况时,系统应采用短信通讯方式向至少 3 名指定人员发出报警信息

15.依据《药品经营质量管理规范》附录规定,某药品经营企业的平面仓库面积为 400 平方米,库区内至少安装温湿度自动监测系统几个测点终端 (B)

A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个 E.6 个

16.依据《药品经营质量管理规范》附录规定,每台独立的冷藏、冷冻药品运输车辆或车厢,安装的温湿度自动监测系统测点终端数量不得少于 (B)

A. 1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 E.6 个

17.依据《药品经营质量管理规范》附录规定,独立的冷藏、冷冻药品的运输车辆车厢容 30 立方米,应安装温湿度自动监测系统测点终端数量是 (C)

A. 1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 E.5 个

18.依据《药品经营质量管理规范》附录规定,每一独立的药品库房或仓间至少安装温湿度自动监测系统测点终端数量正确的是 (B)

A. 1 个 B.2 个 C.3 个 D.4 个 E.5 个

19.依据《药品经营质量管理规范》附录规定,下列无需进行验证管理的是 (E)

A.冷库 B.冷藏车
C.温湿度自动监测系统 D.保温箱
E.中药材标本室空调设备

20.下列哪项不是验证报告包括的内容 (E)

A.验证实施人员 B.验证现场实景照片
C.各测试项目结果分析 D.验证结果总体评价
E.验证预防措施

21.依据《药品经营质量管理规范》,企业应对相关设施设备及监测系统进行定期验证,定期验证时间间隔为 (A)

A.不超过 1 年 B.1 年 C.2 年 D.3 年 E.5 年

22.下列对冷藏箱验证的项目不包括的是 (D)

A.箱内温度分布特性的测试与分析
B.蓄冷剂配备使用的条件测试
C.温度自动监测设备放置位置确认
D.运输最短时限验证
E.高温或低温等极端外部环境条件下的保温效果评估

23.企业应当根据验证对象及项目，合理设置验证测点。以下对验证测点描述错误的是 (D)

- A.在被验证设施设备内一次性同步布点
- B.在被验证设施设备内，进行均匀性布点
- C.仓间各角及中心测位置均需布置测点
- D.库房每个作业出入口至少布置 2 个测点
- E.库房中每组货架的风向死角位置至少布置 3 个测点

24.企业应当确定适宜的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续。

下列对验证时间描述错误的是 (D)

- A.在库房内数据有效持续采集时间不得少于 48 小时
- B.在冷藏车内数据有效持续采集时间不得少于 5 小时
- C.冷藏箱或保温箱按照最长的配送时间连续采集数据
- D.验证数据采集的间隔时间不得大于 30 分钟
- E.应当确保验证时间的真实、完整、有效、可追溯

25.依据《药品经营质量管理规范》，药品批发企业必须具备大学本科以上学历、取得执业药师资格的是 (C)

- A.企业负责人
- B.质量机构负责人
- C.企业质量负责人
- D.质量管理员
- E.质量验收员

26.依据《药品经营质量管理规范》，下列对从事采购工作人员学历要求正确的是 (B)

- A.高中以上文化程度
- B.药学中专以上学历
- C.药学大专以上学历
- D.具有药学初级以上专业技术职称
- E.具有药学中级以上专业技术职称

27.随货同行单应当加盖的原印章是 (D)

- A.业务专用章
- B.财务专用章
- C.发票专用章
- D.药品出库专用章
- E.质量部门专用章

28.企业销售药品，应当如实开具发票，并要求做到的是 (D)

- A.票、账、货一致
- B.票、货、款一致
- C.票、账、款一致
- D.票、账、货、款一致
- E.账、货、款一致

29.药品经营企业违反《药品管理法》规定，给药品使用者造成损害的，依法承担赔偿责任，这属于 (A)

- A. 民事责任
- B. 刑事责任
- C. 政治责任
- D. 行政责任
- E. 行政处罚

30.下列药品中药品上市许可持有人不得委托生产的是 (D)

- A. 牛黄清心丸
- B. 羚羊感冒片
- C. 川贝枇杷止咳糖浆
- D. 制麻黄
- E. 狂犬疫苗

31.根据《药品管理法》规定，以下说法错误的是 (B)

- A. 国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准
- B. 国务院卫生健康主管部门负责国家药品标准的制定和修订
- C. 列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称
- D. 已经作为药品通用名称的，该名称不得作为药品商标使用
- E. 批准上市药品的审评结论和依据应依法公开

32.从事药品生产活动须经所在地省、自治区、直辖市人民政府对药品监督管理部门批准，取得 (B)

- A. 药品经营许可证
- B. 药品生产许可证
- C. 公司营业执照
- D. 卫生许可证
- E. 税务登记证

33.医疗机构配置的制剂下列说法错误的是 (B)

- A. 凭医师处方在本单位使用
- B. 可以在市场上出售
- C. 不准在市场上销售
- D. 经药品监督管理部门批准可以在指定的医疗机构之间调剂使用
- E. 取得《药品经营许可证》的企业不得销售

34.最新修订的《药品管理法》的实施时间为 (E)

- A. 2013 年 12 月 28 日
- B. 2020 年 4 月 24 日
- C. 2016 年 12 月 1 日
- D. 2019 年 8 月 26 日
- E. 2019 年 12 月 1 日

35.药品经营企业购进药品，应当验明药品合格证明和其他标识，建立并执行的制度是 (B)

- A.发货检查验收
- B.进货检查验收
- C.出货检查验收
- D.收货检查验收
- E.验货检查验收

36.负责国家药品标准的制定和修订的是 (C)

- A. 国务院卫生健康主管部门
- B.工商行政管理部门
- C. 国家药典委员会
- D.司法部门
- E.药品监督管理部门

37.根据《药品管理法》规定，以下说法错误的是 (C)

- A. 国务院药品监督管理部门主管全国药品监督管理工作
- B. 国务院有关部门在各自职责范围内负责与药品有关的监督管理工作
- C.省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门负责配合国务院有关部门执行国家药品行业发展规划和产业政策
- D.设区的市级、县级人民政府承担药品监督管理职责的部门负责本行政区域内的药品监督管理工作
- E.县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责与药品有关的监督管理工作

38.药品广告中可以使用的广告语是 (D)

- A.安全无副作用
- B. 国家级新药
- C.无效退款
- D.按药品说明书或在执业药师指导下使用
- E. 中华医学会推荐

39.按我国有关药品广告管理规定，可在大众媒体广告宣传的药品有 (A)

- A.草珊瑚含片
- B.医院制剂
- C.经批准试生产的药品
- D.进口药品
- E.二类精神药品

40. 以下按假药处理的是 (A)

- A.药品所含成份与国家药品标准规定成份不符的
- B.被污染的药品
- C.超过有效期的药品
- D.必须检验而未检验即销售的
- E.必须批准而未经批准进口的

41.根据《药品管理法》规定，药品经营企业中直接接触药品的工作人员，应当多久进行一次健康检查 (D)

A.每个月 B.每季度 C.每半年 D.每年 E.每两年

42.未取得药品经营许可证销售药品的，没收违法销售的药品和违法所得，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (D)

A.货值金额十倍以上二十倍以下
B.货值金额十倍以上三十倍以下
C.货值金额二倍以上十倍以下
D.货值金额十五倍以上三十倍以下
E.货值金额五倍以上十五倍以下

43.生产、销售劣药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (A)

A.货值金额十倍以上二十倍以下
B.货值金额十倍以上三十倍以下
C.货值金额二倍以上十倍以下
D.货值金额十五倍以上三十倍以下
E.货值金额五倍以上十五倍以下

44.生产、销售假药的，没收违法生产、销售的药品和违法所得，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (D)

A.货值金额十倍以上二十倍以下
B.货值金额十倍以上三十倍以下
C.货值金额二倍以上十倍以下
D.货值金额十五倍以上三十倍以下
E.货值金额五倍以上十五倍以下

45.违反《药品管理法》规定，药品上市许可持有人未从药品上市许可持有人或者具有药品生产、经营资格的企业购进药品的，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (C)

A.货值金额十倍以上二十倍以下
B.货值金额十倍以上三十倍以下
C.货值金额二倍以上十倍以下
D.货值金额十五倍以上三十倍以下
E.货值金额五倍以上十五倍以下

46.知道或者应当知道属于假药、劣药而为其提供储存、运输等便利条件的，没收全部储存、运输收入，情节严重的，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (E)

- A.违法收入十倍以上二十倍以下
- B.货值金额十倍以上二十倍以下
- C.货值金额五倍以上十五倍以下
- D.违法收入十倍以上三十倍以下
- E.违法收入五倍以上十五倍以下

47.伪造、变造、出租、出借、非法买卖许可证或者药品批准证明文件，情节严重的，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (E)

- A.货值金额十倍以上二十倍以下
- B.违法所得十倍以上三十倍以下
- C.货值金额二倍以上十倍以下
- D.违法所得十五倍以上三十倍以下
- E.违法所得五倍以上十五倍以下

48.生产、销售的中药饮片不符合药品标准，尚不影响安全性、有效性的。下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (C)

- A.二万元以上二十万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- C.十万元以上五十万元以下
- D.十万元以上一百万元以下
- E.五十万元以上二百万元以下

49.提供虚假的证明、数据、资料、样品或其他手段骗取药品经营许可的，撤销相关许可，情节严重的，下列对有关责任人员处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (A)

- A.二万元以上二十万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- C.十万元以上五十万元以下
- D.十万元以上一百万元以下
- E.五十万元以上二百万元以下

50.根据《药品管理法》规定，未按照规定提交年度报告，责令限期整改，给予警告；逾期不整改的，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (C)

- A.二万元以上二十万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- C.十万元以上五十万元以下
- D.十万元以上一百万元以下
- E.五十万元以上二百万元以下

51.医疗机构未按照规定报告疑似药品不良反应的，责令限期整改，给予警告；逾期不整改的，下列处罚幅度符合《药品管理法》规定的是 (B)

- A.二万元以上二十万元以下
- B.五万元以上五十万元以下
- B.十万元以上五十万元以下
- D.十万元以上一百万元以下
- E.五十万元以上二百万元以下

52. 当事人对药品检验机构的检验结果有异议的，可以自收到药品检验结果之日起几日内向有关单位申请复验 (C)

- A.三
- B.五
- C.七
- D.十
- E.十五

53.根据最新实施的《药品管理法》规定，下列可以申请成为药品上市许可持有人的是 (D)

- A.广西省某药品零售连锁企业的总经理
- B. 四川省某药品批发企业的董事长
- C.河南省某药物研究所的研究员
- D.江苏省某药品研究所
- E.河北省某药品企业的法定代表人

54.根据医疗机构和药品零售企业上报的药品不良反应报告，经药品监督管理部门评估，确定该药品存在安全隐患，承担该药品召回的责任主体是 (A)

- A.该药品的上市许可持有人
- B.医疗机构
- C.药品零售企业
- D.受托药品生产企业
- E.药品监督管理部门

55.某药品零售企业销售超有效期的药品，对于该药品零售企业将接受的处罚，下列正确的是 (D)

- A. 造成患者人身伤害的，可不关闭该药品零售企业
- B. 处所获收入百分之三十以上三倍以下的罚款
- C. 处十万元以上五十万元以下的罚款
- D. 若销售的药品货值金额为 8500 元，则处罚 100000 元
- E. 若销售的药品货值金额为 95000 元，则处罚 95000 元

56.某省中药饮片生产的某种中药饮片，其标签标示“功能主治：清热、平肝、提升免疫力、抗癌”，与本省中药饮片炮制规范注明的功能主治“清热、平肝”不符，该批药物经抽样检验均符合规定，该批中药饮片应定性为 (B)

- A. 劣药
- B.假药
- C.合格药品
- D.违反说明书和标签管理规定的药品

E.无法定性

57.《药品管理法》（2020年修正版）目录共计十章 104 条；《药品管理法》（2019年修订版）目录共计为（D）

- A.十章；120 条
- B.十章；135 条
- C.十二章；120 条
- D.十二章；155 条
- E.十二章；165 条

58.新版《药品管理法》中规定药品经营企业购销记录新增的项目是（A）

- A.上市许可持有人
- B.产品批号
- C.剂型
- D.有效期
- E.生产企业

59.药品应当从允许药品进口的口岸进口，并由进口药品的企业向口岸所在地药品监督管理部门备案。海关凭药品监督管理部门出具的证明文件是（A）

- A.进口药品通关单
- B.进口药品许可证
- C.进口药品注册证书
- D.进口药品放行证
- E.进口药品准许证

60.除依法应当按照假药、劣药处罚的外，药品包装未按照规定印有、贴有标签或者附有说明书，标签、说明书未按照规定注明相关信息或者印有规定标志的，责令改正，给予警告；情节严重的，吊销下列证明的是（B）

- A.药品生产许可证
- B.药品注册证书
- C.营业执照
- D.批准文号
- E.批准证明文件

61.药品经营企业中，对药品经营活动全面负责的是（A）

- A.法定代表人、主要负责人
- B.法定代表人、质量负责人
- C.主要负责人、质量负责人
- D.质量负责人、质量部门负责人
- E.质量负责人、其他直接责任人员

62.依据《药品管理法》，负责药品标准品、对照品标定的单位是（D）

- A.药典委员会
- B.省级药品检验机构
- C.直辖市药品检验机构
- D.中国食品药品检定研究院
- E.国务院卫生健康委员会

63.《药品法》规定，城乡集市贸易市场可以出售中药材，下列药品中不可以出售的是（E）

- A.重楼
- B.人参
- C.商陆
- D.木鳖子
- E.洋金花

64.《中华人民共和国行政诉讼法》规定，人民法院不予受理的诉讼是(D)

- A.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的?
- B.对责令停产停业、没收财物等行政处罚不服的?
- C.对罚款、吊销许可证和执照等行政处罚不服的?
- D.行政机关工作人员对行政机关作出的奖惩、任免等决定不服的

65.临床试验是指任何在人体进行的药物系统性研究，以证实或揭示试验药物的作用，临床试验分为四期治疗作用初步评价阶段属于 (B)

- A.I 期临床试验
- B.II 期临床试验
- C.III 期临床试验
- D.IV 期临床试验

66.有关基本医疗保险用药，说法错误的是 (B)

- A.口服泡腾剂不能纳入医疗保险用药范围
- B.血液制品不能纳入医疗保险用药范围
- C.基本医疗保险药品目录中的中药饮片属于基本医疗保险基金不予支付的药品
- D.基本医疗保险药品目录中的中成药属于基本医疗保险基金准予支付的药品

67.某市药品监督管理部门在日常的监督检查中，发现某药品生产企业擅自将库存老批号中药降糖药重新加工成新批号产品出厂销售，货值金额 10 万元。截止到案发，尚未造成危害。该中药降糖药为 (A)

- A. 劣药
- B. 假药
- C.合格药品
- D.无证生产

68.关于药品监督检查的说法，错误的是 (A)

- A.药品经营监督检查分为许可检查、跟踪检查和有因检查，实施检查时可以采取飞行检查、延伸检查等方式
- B.任何单位和个人都不得拒绝、逃避药品监督管理部门进行的监督检查
- C.省级药品监督管理部门应当依职责对辖区内药品上市许可持有人实施药品生产、经营质量管理规范的情况开展监督检查
- D.对于委托销售、储存、运输跨区域实施的，委托方、受托方所在地药品监督管理部门应当加强信息沟通，及时通报监督检查情况

69.根据《药品经营质量管理规范》企业对同一批号药品的验收要求是 (A)

- A.应当至少检查一个最小包装
- B.应当开箱检查至直接接触药品的包装
- C.可不开箱检查
- D.可不打开最小包装

70.特殊医学用途配方食品是指为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态人群对营养素或者膳食的特殊需要，专门加工 配制而成的配方食品。

关于特殊医学用途配方食品管理的说法，错误的是 (C)

- A. 特殊医学用途配方食品参照药品管理，该类食品应当经过国家市场监督管理总局注册
- B.特殊医学用途配方食品广告参照药品广告的有关规定予以处理
- C.特殊医学用途配方食品注册号的格式为:国食注字 TP+XXXX(4 位年号)+XXXX(4 位顺序号)
- D.特殊医学用途配方食品注册证书有效期为 5 年

71.下列药品说明书和标签中，药品名称和标识符合规定的是 (A)

- A.某药品的商品名字体以单字面积计等于通用名所用字体的二分之一
- B.某外用乳膏标签上采用蓝底白色字体的“外”字标识
- C.某药品的通用名字体采用深绿色，与背景形成强烈反差
- D.某药品的注册商标字体以单字面积计等于通用名所用的字体的三分之一

72.属于麻醉药品的是 (D)

- A.麦角新碱
- B.甲丙氨酯
- C.哌醋甲酯
- D.地芬诺酯

73.关于药品包装、标签和说明书的说法，错误的是(A)

- A.处方药、非处方药、外用药、特殊管理的药品等专用标识在说明书首页的右上方标注
- B.药品包装应当适合药品质量的要求，方便储存、运输和医疗使用，药品的包装分为内包装和外包装
- C.药品批准文号是鉴别假药的重要依据之一
- D.药品有效期是鉴别劣药的重要依据之一

74.《处方药与非处方药分类管理办法》属于 (B)

- A. 法律
- B.部门规章
- C.地方性法规
- D.行政法规

75.国务院颁布的《药品管理法实施条例》属于 (B)

- A.法律
- B.行政法规
- C.部门规章
- D.司法解释

76.某药品的生产批号为 140051，生产日期为 2014 年 9 月 20 日，有效期为 2 年，其有效期可以标注为(B)。

- A.有效期至 2016/31/08 B.有效期至 2016 年 08 月
C.有效期至 2016 年 09 月 D.有效期至 2016.09.01

77.根据《中华人民共和国反不正当竞争法》，不属于不正当竞争行为的是(C)

- A.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分,网站名称,网页
B.抽奖式的有奖销售最高奖的金额超过五万的
C.经营者在交易活动中,给对方明示支付折扣并如实入账
D.利用职权或者影响力影响交易的单位或个人

78.根据下列部门的主要职责、内设机构和人员编制规定，负责提出国家基本药物价格政策建议的部门是(B)。

- A.国家医疗保障局
B.国家卫生健康委员会
C.国家发展和改革委员会
D.国家市场监督管理总局

79.关于药品注册类别管理要求的说法，错误的是(A)。

- A.中药注册按照中药创新药、中药改良型新药、中药同名同方仿制药等进行分类
B.药品注册按照中药、化学药和生物制品等进行分类注册管理，
C.境外生产药品的注册申请，按照药品的细化分类和相应的申报资料 要求执行
D.化学药注册按照化学药创新药、化学药改良型新药、仿制药等进行分类

80.根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，某药品零售企业出售了数量严重短缺的板蓝根颗粒剂，且拒不赔偿，此行为主要侵犯了消费者的(B)

- A.安全保障权 B.获得赔偿权
C.自主选择权 D.监督权

81.医疗器械经营许可证有效期为(D)

- A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.5 年

82.应当慎重经验用药的是(B)

- A.主要目标细菌耐药率超过 30%的抗菌药物
B.主要目标细菌耐药率超过 40%的抗菌药物
C.主要目标细菌耐药率超过 50%的抗菌药物
D.主要目标细菌耐药率超过 75%的抗菌药物

83.医疗机构根据本单位临床需要，经批准可以配制制剂。下列符合医疗机构制剂室设置条件的是(D)

- A.与其他医疗机构共用配制场所、配制设备及检验设施

- B.必须由医疗机构药学部与提出临床需要的临床科室共同设立
- C.制剂室负责人可以由药品生产企业质量负责人兼任
- D.有能够保证制剂质量的设施、管理制度、检验仪器和卫生环境

84.医疗机构购进药品，必须有 (A)

- A.真实、完整的药品购进记录
- B.符合医疗机构临床的需要
- C.药品采购部门
- D.真实、完整的药品购销记录

85.《药品经营质量管理规范实施细则》中规定中药饮片应标明 (C)

- A.品名、产地、供货单位
- B.品名、产地、生产日期
- C.品名、生产企业、生产日期
- D.品名、生产企业、供货单位

86.麻醉药品和精神药品的目录由 (D)

- A.国家药品监督管理部门制定和调整
- B.卫生健康委制定和调整
- C.公安部制定和调整
- D.国家卫生健康委、国家药品监督管理部门、公安部共同制定和调整

87.新的药品不良反应是指 (B)

- A.新药的不良反应
- B.药品说明书中未载明的不良反应
- C.新出现的不良反应
- D.突发的药品不良反应

88.药品的生产企业、经营企业、医疗机构在药品购销中暗中给予、收受回扣或者其他利益的，由(B)

- A.卫生行政部门处罚
- B.工商行政管理部门处罚
- C.经济综合主管部门处罚
- D.药品监督管理部门处罚

89.国务院和有关部门出台了一系列支持药品零售连锁发展的政策性文件。关于相关政策的说法，错误的是(D)。

- A.国家鼓励药品零售连锁企业在乡镇、村镇设店，支持其进入农村市场
- B.允许药品零售连锁企业委托符合《药品经营质量管理规范》的物流企业向本企业所属门店配送药品，药品零售连锁企业可以不再设立仓库
- C.鼓励“互联网+药品流通”模式，允许药品零售连锁企业采取“网订店取”“同订店送”方式销售药品
- D.根据《麻醉药品和精神药品管理条例》药品零售连锁企业均可以经营第二类精神药品

90.根据《中成药通用名称命名技术指导原则》，来源于古代经典名方的各种中成药制剂的通用名称应该 (C)

- A.必须更名 B.可不更名
C.不予更名 D.强制更名

91.患者凭医疗机构开具的处方到甲药品零售企业调剂处方药 H，同时购买处方药 1、甲类非处方药 J 和乙类非处方药 K，甲药品零售企业为患者提供药品 H、1、J、K 的同时，又赠送患者近效期的非处方药 L。该患者购买药品之后，欲寻求执业药师指导用药，被告知执业药师不在岗。（D）

- A.执业药师不在岗时，调剂药品 H
B.执业药师不在岗时，销售药品 1、J
C.执业药师不在岗时，未挂牌告知
D.执业药师不在岗时，销售药品 K

92.对某市药品监督管理部门作出的行政处罚行为不服的，提出行政复议的时效一般为（B）

- A.15 日 B.60 日 C.3 个月 D.6 个月

93.了解超剂量应用可能发生的毒性反应及处理方法，可查（D）

- A.【用法用量】 B.【药物相互作用】
C.【禁忌】 D.【药物过量】

94.根据药品管理法律法规及相关文件的规定，药品零售企业可以开架自选销售的药品是(B)。

- A. 复方甘草片 B.复方金银花颗粒
C.复方地芬诺酯片 D.复方枇杷喷托维林颗粒

95.非处方药目录的审批部门是（A）

- A.国家药品监督管理部门 B.国家药典委员会
C.国家卫生行政部门 D.省级药品监督管理部门

96.临床必需、使用广泛、效果好、在同类药品中价格低的是（D）

- A.国家批准正式进口的药品
B.《基本医疗保险药品目录》中的西药和中成药
C.《基本医疗保险药品目录》中的中药饮片
D.甲类目录药品

97.根据药品零售的经营行为管理要求药学服务人员应当核实药品说明书和标签中“运动员慎用”标注情况，并告知个人消费者“运动员慎用”的是（C）

- A.第二类精神药品 B.含特殊药品复方制剂
C.含兴奋剂类药品 D.药品类易制毒化学品

98.关于网络销售药品管理的说法，错误的是(D)。

A.，药品零售企业不得通过网络销售含麻黄碱类复方制剂等国家有专门管理要求的药品

B.药品网络销售者，应当对配送药品的质量安全负责，保障药品储存、运输过程符合《药品经营质量管理规范》的相关要求

C.药品网络交易第三方平台提供者，应当依法对申请入驻经营的药品上市许可持有人、药品经营企业的有关资质等进行审核，保证其符合法定要求，并对发生在平台上的药品经营行为进行管理

D.特殊情形下，第二类精神药品、毒性中药饮片、蛋白同化制剂和肽类激素等药品可以通过网络交易

99.纳入麻醉药品销售渠道经营，零售药店不得销售的是 (D)

A.复方甘草片

B.尿通卡克乃其片

C.含麻黄碱类复方制剂

D.药品类易制毒化学品单方制剂

100.根据《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》，关于仿制药与原研药关系的说法，错误的是 (C)

A.应具有相同的活性成分

B.质量与疗效一致

C.应具有相同的处方工艺

D.具有生物等效性

101.颁发《执业药师注册证》的机构是 (C)

A.国家卫生行政部门

B.国家药品监督管理部门

C.省级药品监督管理部门

D.中国药师协会

102.负责非处方药目录审批和发布的部门是 (C)

A.国家药典委员会

B.国家卫生行政部门

C.国家药品监督管理部门

D.省级药品监督管理部门

103.未取得麻醉药品处方资格的执业医师擅自开具麻醉药品的 (D)

A.造成严重后果的，由原发证部门吊销其执业证书

B.由所在医疗机构取消其麻醉药品和第一类精神药品处方资格，造成严重后果的，由原发证机关吊销其执业证书

C.由药品监督管理部门责令限期改正，给予警告

D.由县级以上卫生健康主管部门给予警告，暂停其执业活动，造成严重后果的，吊销其执业证书

104.承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作的部门是 (C)

A.商务部

B.国家食品药品监督管理总局

C.工业和信息化部 D.国家卫生与计划生育委员会

105.有关生产企业生产医疗用毒性药品规定的说法，错误的是(A)

- A.生产医疗用毒性药品的计划有国家药品监督管理部门批准
- B.生产医疗用毒性药品必须按照经过批准的生产计划生产
- C.医疗用毒性药品的生产必须由医药专业人员负责配制和质量检验
- D.每次配料必须由 2 人以上负责
- E.每次配料必须由 4 人以上负责

106.《中药材生产质量管理规范》的适用范围是(A)

- A.中药材生产企业生产中药材(含植物、动物药)的全过程
- B.中药材种植的过程
- C.药品生产企业生产中药饮片的全过程
- D.药品生产企业生产中成药的全过
- E.中药材生产企业采集与加工中药材的全过程

107.医疗机构申请《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》应当符合的条件是(B)

- A.具有与公安机关报警系统联网的报警装置
- B.具有与使用麻醉药品和第一类精神药品相关的诊疗科目
- C.具有使用麻醉药品、精神药品能力的主治医师以上的医师
- D.具有兼职从事麻醉药品和第一类精神药品管理的药学专业技术人员
- E.具有全职从事麻醉药品和第一类精神药品管理的药学专业技术人员

108.新活性成分的发现与筛选属于哪个阶段(E)

- A.生产和上市后研究 B.I 期临床试验
- C.临床试验 D.I 期临床试验
- E.临床前研究阶段

109.在连续生产情况下，批必须与生产中具有确定数量的产品相对的特性是(D)

- A.有效 B.安全 C.可控 D.均一 E.经济

110.关于成品的留样说法不正确的是(C)

- A.每批药品均应当有留样
- B.留样的包装形式应当与药品市售包装形式相同
- C.留样应当按照注册批准的贮存条件至少保存至药品有效期后三年
- D.留样观察应当有记录
- E.留样观察应当有检验报告

111.实施基本药物制度的目标不包括(B)

- A.改变医疗机构“以药补医”的运行机制，体现基本医疗卫生的公益性
- B.保证每位患者能获得最好的医疗救助
- C.提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求
- D.规范药品生产流通使用行为，促进合理用药，减轻群众负担
- E.维护群众的基本医疗卫生权益，促进社会公平正义

112.医疗机构药事管理包括以下哪些内容(D)

- A.药品的采购、储存管理
- B.药品的调剂及配制制剂的管理
- C.药品的质量和经济管理
- D.以上都是

113.新药的临床前研究包括的内容是(C)

- A.生物等效性试验
- B.无要求
- C.制备工艺、理化性质、质量标准、药理、毒理、动物药代动力学等研究
- D.不良反应的考察
- E.人体安全性评价

114.下列哪一项不是生产、销售假药的处罚(C)

- A.没收违法生产、销售的药品和违法所得
- B.责令停业整顿，吊销药品批准证明性文件
- C.处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款
- D.处违法生产、销售的药品货值金额十五倍以上二十倍以下的罚款
- E.情节严重的，吊销生产许可证、药品经营许可证或者医疗机构制剂许可证，十年内不受理其相应申请

115.标注药品商品名称的规定，正确的是(D)

- A.药品通用名称的字体和颜色不得比药品商品名称更突出和显著
- B.药品商品名称的字体以单字面积计不得大于通用名称所用字体的四分之一
- C.不得选用草书、篆书等不易识别字体
- D.药品商品名称不得与通用名称同行书写
- E.药品商品名称的字体颜色应当使用黑色或者白色

116.关于疫苗流通管理的说法，错误的是(B)。

- A.疫苗上市许可持有人在销售疫苗时，应当提供加盖其印章的批签发证明复印件或者电子文件

B.疫苗上市许可持有人应当按照采购合同约定,向疾病控制机构和接种单位直接供应疫苗

C.疫苗上市许可持有人应当按照规定,建立真实、准确完整的销售记录,并保存至疫苗有效期满后不少于五年备查

D.疾病预防控制机构、接种单位应当建立疫苗定期检查制度

117.企业应当建立投诉与不良反应报告和监测制度,下面叙述不正确的是(D)

A.应建立操作规程 B.配备专职的负责人

C.设立专门机构 D.配备兼职人员即可

E.配备企业负责人

118.药品信息的特征,不包括(D)

A.价值性和目的性 B.时效性和动态性

C.无限性 D.科幻性

E.虚假性

119.完成临床试验后,药品生产企业可向哪个部门申请药品批准文号(A)

A.国家药品监督管理部门 B.省级药品监督管理部门

C.市级药品监督管理部门 D.市级以上药品监督管理部门

E.县级药品监督管理部门

120.关于药品标签、说明书管理的说法,错误的是(D)

A.同一药品上市许可持有人生产的同一药品,分别按处方药与非处方药管理的,二者包装颜色必须明显区别

B.由于包装尺寸或者技术设备等原因,标签中的有效期无法标注“有效期至某年某月”的,可以标注有效期实际期限

C.对贮藏有特殊要求的药品,应当在标签的醒目位置注明

D.药品内标签至少应当标注药品通用名称、产品批号和有效期

121.在我国医疗服务体系中占主体和主导地位的医疗机构是(A)

A.非营利性医疗机构 B.营利性医疗机构

C.政府举办的非营利性医疗机构 D.其他非营利性医疗机构

122.企业应按照操作规程,对所有的药品按照品种进行产品质量回顾分析,频率是(C)

A.每2年一次 B.每半年一次

C.每年一次 D.每月一次

E.每季度一次

123.有关医疗用毒性药品的管理，下列说法正确的是(B)

- A.采购的毒性中药材，包装材料上无须标上毒药标志
- B.生产含有毒性药材的中成药时，须在本单位药品检验员的监督下准确投料
- C.医疗单位供应和调配毒性药品每次处方剂量不得超过 15 日极量
- D.科研和教学单位所需的毒性药品，凭本单位介绍信，在指定的供应部门购买
- E.医疗单位供应和调配毒性药品每次处方剂量不得超过 3 日极量

124.胰岛素及其类似物属于哪一类兴奋剂类药品(A)

- A.肽类激素
- B.刺激剂
- C.土的宁
- D.麻醉药品
- E.蛋白同化制剂

125.违反《麻醉药品和精神药品管理条例》的规定，运输麻醉药品和精神药品的，所处的罚款是(C)

- A.5 万元以上 10 万元以下
- B.3 万元以上 5 万元以下
- C.2 万元以上 5 万元以下
- D.2 万元以上 4 万元以下
- E.1 万元以上 3 万元以下

126.对贮藏有特殊要求的药品，应当在其标签的什么位置注明(C)

- A.右 1/3 范围内
- B.上 1/3 范围内
- C.醒目
- D.左 1/3 范围内
- E.正中

127.我国药品价格的定价形式分为(B)

- A.政府定价、政府指导价、经营者自主定价、市场调节价四类
- B.政府定价、政府指导价和市场调节价三类
- C.政府定价、政府指导价两类
- D.政府指导价、经营者自主定价两类

128.具有销售第二类精神药品资格的零售企业(C)

- A.应当凭执业助理医师出具的处方，按规定剂量销售第二类精神药品 B、应当凭医师出具的处方，按医嘱剂量销售第二类精神药品
- C.应当凭执业医师出具的处方，按规定剂量销售第二类精神药品
- D.应当凭执业药师出具的处方，按医嘱剂量销售第二类精神药品
- E.应当凭执业医师出具的处方，按医嘱剂量销售第二类精神药品

129.关于药品标准制定原则的说法，正确的是(B)。

- A.坚持质量第一，体现“安全有效、科学严谨、技术可行、经济合理”的原则，全面与国际标准接轨，起到促进质量提高的作用
- B.根据“准确、灵敏、简便、迅速”的原则，选择并规定检测、检验方法，既要考虑现阶段的实际水平和条件，又要体现新技术的应用和发展
- C.标准规定的各种限量应当结合实践，要保证新药在研制、生产、经营和使用环节的质量安全
- D.充分考虑研制、生产、经营和使用各环节对药品质量影响因素，全面制定检测项目，加强对药品内在质量的控制

130.以下哪个部门主管全国药品类易制毒化学品生产的监督管理工作(B)

- A.省级药品监督管理部门
- B.国家药品监督管理部门
- C.市级市场监督管理部门
- D.国家医疗卫生行政部门
- E.国家公安部门

131.导致不合理用药的因素中，以下属于病人因素的是(D)

- A.调配处方时审方不严
- B.服务态度不好
- C.给药过程操作不规范
- D.经济承受能力不足
- E.临床用药不合理

132.应经单独论证才能纳入《国家基本药物目录》遴选范围的是(C)

- A.易滥用的、主要用于滋补保健作用的中成药
- B.有严重不良反应的生物制品
- C.除急救、抢救用药外的独家生产品种
- D.非临床治疗首选的化学药品
- E.含有国家濒危野生动物、植物药材的中成药

133.药品说明书和标签管理规定，药品的最小销售单元是指直接供上市药品的(C)

- A.中包装
- B.内包装
- C.小包装
- D.外包装

134.药品批发企业记录及凭证保存时间至少(B)

- A.6年
- B.5年
- C.2年
- D.3年
- E.4年

135. 根据《进口药材管理办法》不得作为首次进口药材审批的申请人或者备案单位的是(C)。

- A.中国境内的中成药上市许可持有人
- B.中药生产企业
- C.中药材专业市场

D.具有中药饮片经营范围的药品经营企业

136.药品说明书中所列的【有效期】是指该药品被批准的(E)

- A.安全期限
- B.贮存期限
- C.疗程期限
- D.生产日期
- E.使用期限

137.下列符合化妆品管理要求的是(C)。

- A.特殊化妆品需经省级以上药品监督管理部门注册后方可生产、进口和经营
- B.国产普通化妆品在上市销售后，向所在地省级药品监督管理部门备案 C.国家按照风险程度对化妆品、化妆品原料实行分类管理
- D.已经注册的特殊化妆品在生产工艺、功效宣称等方面发生任何变化，注册人均应当向原注册部门申请变更注册

138.下列选项中表示处方药的为(C)

- A.EXP
- B.R
- C.Rx
- D.OTC
- E.OCT

139.根据《麻醉药品和精神药品管理条例》，下列情形中，由药品监督管理部门作出责令限期改正，给予警告，并没收违法所得和违法销售的药品;逾期不改正的，责令停业，并处五千元以上两万元以下的罚款;情节严重的，取消其精神药品经营资格。该情形是(A)

- A.第二类精神药品零售企业违反规定销毁第二类精神药品
- B.定点批发企业违反规定销售精神药品
- C.区域性批发企业之间，违反规定调剂第一类精神药品
- D.药品批发企业违反规定购买、储存精神药品

140.药品最小包装标签上的内容可以不包括(D)

- A.有效期
- B.规格
- C.药品通用名称
- D.生产日期
- E.生产批号

141.指同一药品在使用过程中，在相对集中的时间、区域内，对一定数量人群的身体健康或者生命安全造成损害或者威胁，需要予以紧急处置的事件属于(C)

- A.疑似药品不良反应
- B.轻微药品不良反应
- C.药品群体不良反应事件
- D.严重药品不良反应
- E.新的药品不良反应

142.《医疗机构制剂许可证》的核发部门为(A)

- A.省级药品行政监督管理部门
- B.市级药品行政监督管理部门

C.国家卫生行政监督管理部门 D.国家药品行政监督管理部门

143.根据国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，关于仿制药供应保障及使用配套支持政策的说法，错误的是(A)。

A.促进“临床必需、疗效确切、价格合理”的仿制药研发，鼓励仿制 重大传染病防治和罕见病治疗所需药品

B.药品集中采购机构要按照药品通用名编制采购目录，及时将符合条件的仿制药纳入采购目录范围

C.将与原研药质量和疗效一致的仿制药纳入与原研药可以相互替代的药品目录，在说明书、标签中予以标注

D.加快制定医保药品支付标准，原研药、与原研药质量和疗效一致的仿制药按照相同标准支付

144.根据健康中国战略，推进健康中国建设主要遵循的原则不包括(D)。

A.健康优先 B.改革创新

C.科学发展 D.公开透明

145.根据处方药与非处方药分类管理要求，下列销售行为错误的是(B)。

A.药品零售企业对疑似假冒或者不合法处方，应当断然拒绝调配，并向所在地药品监管部门报告

B.药品零售企业不得采用开架自选的方式销售处方药，可以采用“捆绑搭售”“满优惠”等方式赠送销售非处方药

C.销售处方药时，处方应当经执业药师审核，调配处方应当经过核对，对方所列药品不得擅自更改或者代用，对有配伍禁忌的处方，应当拒绝调配

D.第二类精神药品，肿瘤治疗药，精神障碍治疗药等在药品零售企业必须严格凭处方销售

146.国家以保障公众用药安全为目标，以落实企业主体责任为基础，以实现“一物一码，物码同追”为方向，加快推进药品信息化追溯体系建设。其中关于“一物一码”的说法，正确的是(D)。

A.每一种药品有一个特定的追溯码

B.同一个规格的药品有一个特定的追溯码

C.同一个生产批号的药品有一个特定的追溯码

D.每一个药品最小销售单元有一个特定的追溯码

147.关于药品上市许可持有人委托储存、运输行为管理要求的说法，正确的是(D)。

- A.药品上市许可持有人应当将受托方储存、运输、销售等行为纳入己方质量管理体系，与其签订委托协议，约定双方药品质量责任，并对受托方进行监督
- B.接受委托储存、运输药品的企业表明不知道承运承储的药品已超过有效期，而为其提供储存、运输服务的，可以免于行政处罚
- C.接受疫苗上市许可持有人委托储存、运输的企业，不得再次委托储存、运输疫苗；不得将疫苗与其他药品混库储存或者混车、混箱运输
- D.药品上市许可持有人应当对受托方的质量保证能力及风险管理能力进行评估，确认受托方符合《药品经营质量管理规范》有关储存、运输的相关要求

148.根据《药品召回管理办法》，关于药品召回的说法，错误的是(B)。

- A.按照性质划分，药品召回分为主动召回、责令召回两类
- B.一级召回、二级召回、三级召回的通知时限要求分别为72小时、48小时和24小时
- C.已经确定为假药劣药的，不适用药品召回程序
- D.省级药品监督管理部门应当对召回总结报告进行审查，并对召回效果进行评价

149.关于医疗机构处方调剂和审核的说法，错误的是(C)。

- A.药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断
- B.药师应当凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得擅自调剂
- C.处方规范性审核包括处方用药与诊断是否相符，选用剂型与给药途径是否适宜，是否存在配伍禁忌
- D.药师审核处方时，对超剂量的处方，应当拒绝调配；必要时经处方医师更正或者重新签字方可调配

150.根据《药品管理法》，下列情形不属于假药的是(D)。

- A.与国家药品标准规定成份不符的化学药
- B.变质的中药饮片
- C.标明适应症超出规定范围的生物制品
- D.被污染的中成药

二、多选题

1.药品批发企业计算机系统应具备下列哪些控制功能 (ABCDE)

- A. 自动生成药品运输记录
- B. 自动生成出库复核记录
- C. 自动生成验收记录
- D. 自动生成采购记录
- E. 近效期预警提示

2. 库房温湿度测量设备的最大允许误差应当符合下列哪些要求 (AD)

- A. 测量范围在 0°C~40°C之间, 温度的最大允许误差为±0.5°C
- B. 测量范围在 1°C~20°C之间, 温度的最大允许误差为±1°C
- C. 测量范围在-25°C~0°C之间, 温度的最大允许误差为±0.5°C
- D. 测量范围在-25°C~0°C之间, 温度的最大允许误差为±1°C
- E. 相对湿度的最大允许误差为±1%RH

3. 养护人员应当对下列哪些品种进行重点养护 (ACDE)

- A. 党参
- B. 石膏
- C. 当归
- D. 山药
- E. 川芎

4. 企业应当依据有关法律法规及 GSP 的要求建立质量管理体系, 确定质量方针, 制定质量管理体系文件, 应开展的活动是 (ABCDE)

- A. 质量策划
- B. 质量控制
- C. 质量保证
- D. 质量改进
- E. 质量风险管理

5. 下列情况需在计算机系统内锁定的是 (AC)

- A. 超有效期的药品
- B. 近效期药品
- C. 质量可疑的药品
- D. 销售退回的药品
- E. 待发货的药品

6. 药品经营企业每年应组织直接接触药品的人员进行健康检查, 患有下列疾病应直接调离直接接触药品岗位的是 (BC)

- A. 糖尿病
- B. 澳抗阳性
- C. 传染病
- D. 心脏病
- E. 高血压

7. 仓库收货人员对以下哪些情况, 有权拒收并报告企业有关部门处理。 (ABCDE)

- A. 包装不牢或破损
- B. 质量异常
- C. 标识模糊
- D. 货与单不符
- E. 无随货同行单及采购记录

8. 下列哪些药品应当专库或专柜存放, 双人双锁保管, 专账记录 (ACE)

- A. 罂粟壳
- B. 厚朴
- C. 生半夏
- D. 人参
- E. 洋金花

9. 企业应当在验证实施过程中, 建立并形成验证控制文件, 文件内容包括 (ACDE)

- A.预防措施
- B.验证所需资金
- C.验证方案
- D.偏差处理
- E.评价

10.企业建立的局域网应具有哪些功能 (BCD)

- A. 自动更新系统日志
- B.部门之间信息传输
- C. 岗位之间信息传输
- D.数据共享
- E. 自动发送电子邮件

11.关于药品批发企业计算机系统以下说法正确的是 (AD)

- A.各操作岗位在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息
- B.修改各类业务经营数据时，操作人员可根据需求直接完成修改，修改原因和过程在系统中予以记录
- C.系统对各岗位操作人员姓名的记录采用手工编辑或菜单选择的方式录入
- D.系统操作、数据记录的日期和时间由系统自动生成
- E.系统各类记录和数据采用安全、可靠的方式储存并按月备份

12.关于药品批发企业计算机系统质量管理基础数据库信息以下说法错误的是 (BC)

- A.质量管理基础数据包括供货单位、购货单位、经营品种等相关内容
- B.系统对接近失效的质量管理基础数据进行提示、预警并自动锁定与该数据相关的业务功能
- C.质量管理基础数据须由储运部门指定人员对相关资料审核合格后，据实确认和更新
- D.质量验收人员只能按规定的权限，查询、使用质量管理基础数据，不能修改数据的任何内容
- E.质量管理基础数据与供货单位或购货单位的经营范围相对应，由系统进行自动跟踪、识别与控制

13.药品经营企业应当建立计算机系统，有关计算机系统以下说法正确的是 (ABCDE)

- A.系统对各供货单位的合法资质，能够自动识别、审核，防止超出经营方式或经营范围的采购行为发生
- B.采购订单确认后，系统自动生成采购记录
- C.药品批发企业系统应当按照药品的管理类别及储存特性，自动提示相应的储存库区

D.系统应依据质量管理基础数据和养护制度，对库存药品按期自动生成养护工作计划

E.系统拒绝无质量管理基础数据或无有效库存数据支持的任何销售订单的生成

14.药品批发企业计算机系统对销后退回药品应具备以下哪些功能 (ABDE)

A.处理销后退回药品时能够调出原对应的销售、出库复核记录

B.退回药品数量超出原销售数量时，系统拒绝药品退回操作

C.系统支持更改原始销售数据

D.对应的销售、出库复核记录与销后退回药品实物信息一致的方可收货、验收

E.系统依据原销售、出库复核记录数据以及验收情况，生成销后退回验收记录

15.温湿度自动检测系统应自动生成温湿度检测记录，内容包括 (ABCDE)

A.温度值

B.湿度值

C.日期及时间

D.测点位置

E.库区或运输工具类别

16.下列对温湿度自动监控描述正确的是 (ABCD)

A.系统具有对记录数据不可更改、删除的功能

B.企业应对储存及运输设施设备的测点终端布点方案进行测试和确认

C.系统应独立地不间断运行

D.系统具有不得有反向导入数据的功能

E.系统可以进行温湿度传感器监测值的修正和调整

17.药品到货时，收货人员应当拒收的情况为 (ABCDE)

A.未采用规定的冷藏设备运输的冷藏药品

B.无随货通行单的

C.无采购记录的

D.药品的剂型和规格与采购记录不符的

E.随货同行单中除数量以外的其他内容与采购记录不符且不予确认的

18.根据 GSP 规定，药品到货时应进行逐批抽样验收，下列说法错误的是 (AD)

A.对抽取的整件药品需开箱检查，从每整件的上、中、下不同位置抽取 2 个最小包装检查

B.对存在封口不牢、标签污染等情况的整件药品，至少再增加一倍抽样数量，进行再检查

C.整件药品存在包装异常的要开箱检查至最小包装

D.到货的非整件药品，随机抽取 3 个最小包装进行检查

E. 同一批号的非整件药品，至少随机抽取 1 个最小包装进行检查

19.下列对包装、标签及说明书的描述符合规定的是 (ABCD)

A.特殊管理药品的包装、标签上有规定的标识和警示说明

B.处方药和非处方药的标签和说明书上有相应的警示语和忠告语

C.非处方药的包装有国家规定的专有标识

D. 中药饮片的整件包装上需标明品名、产地、生产日期、生产企业

E.实施批准文号管理的中药材、中药饮片无需注明批准文号

20. 以下对药品收货与验收描述正确的是 (BC)

A.对验收合格的药品，应由验收人员建立库存记录

B.验收人员应当负责对标本室（柜）中药材样品的更新和养护

C.检查验收结束后应将检查后的完好样品放回原包装并在抽样的整件包装上标明抽验标志

D.验收进口药品时有加盖供货单位公章原印章的相关证明文件

E.检验报告书的传递和保存不能采用电子数据的形式

21.对首营企业的审核，应当查验加盖公章原印章的以下哪些资料 (ABCDE)

A.营业执照证件复印件

B.上一年度企业年度报告公示情况

C.随货同行单样式

D.质量保证体系表

E.开户户名、开户银行及账号

22.依据《药品经营质量管理规范》，悬挂黄色标识的是 (AB)

A.待验区 B.销售退回区

C.不合格品区 D.危险品库

E.养护工具区

23.依据《药品经营质量管理规范》，质量管理部门应当履行的职责是 (ACDE)

A.负责设定计算机系统质量控制功能

B.负责购销合同质量条款的签订

C.组织验证、校准设施设备

D.组织制订质量管理体系文件

E.负责计算机系统操作权限的审核

24.书面记录及凭证应当及时填写，并做到字迹清晰，不得随意涂改，不得撕毁。

更改记录的，应当注明的是 (ABC)

- A.更改理由 B.更改日期
- C.更改人签名 D.审核人签名
- E.审核日期

25.属于特殊管理的药品是 (ACDE)

- A.精神药品 B.血液制品
- C.麻醉药品 D.放射性药品
- E.医疗用毒性药品

26.根据《药品经营质量管理规范》，仓库划分的区域有 (ABCDE)

- A.待验库 (区) B.发货库 (区)
- C.合格品库 (区) D.退货库 (区)
- E.不合格品库 (区)

27.质量管理体系文件中应当标明的是 (ABCDE)

- A.题目 B.种类 C.目的 D.文件编号 E.版本号

28.质量管理基础数据包括 (ABCD)

- A.供货单位 B.购货单位
- C.购货单位采购人员资质 D.提货人员资质
- E.运输人员资质

29.药品批发企业关于药品储存描述正确的是 (ADE)

- A.按药品包装标示的温湿要求储存
- B. 库房相对湿度应保持在 45%~75%
- C. 中药材和中药饮片分区存放
- D. 储存药品实行色标管理
- E.不同批号的药品不得混垛

30.根据《药品管理法》规定，城乡集市贸易市场可以出售中药材，下列药品中不可以出售的是 (BCE)

- A.人参 B.罂粟壳 C.洋金花 D.重楼 E.生附子

31.在中华人民共和国境内从事下列哪些药品活动，适用于《药品管理法》 (ABCDE)

- A.研制 B.生产 C.经营 D.使用 E.监督管理

32.根据《药品管理法》规定，下列对药品上市许可持有人说法错误的是 (AE)

- A.药品上市许可持有人为境外企业的，被指定的在中国境内的企业法人无需履行药品上市许可持有人义务

- B.药品上市许可持有人应当建立并实施药品追溯制度，保证药品可追溯
- C. 中药饮片生产企业需履行药品上市许可持有人的相关义务
- D.药品上市许可持有人可以转让药品上市许可
- E.药品上市许可持有人委托销售的，被委托方无需取得药品经营许可证

33.下面有哪些药品广告是合法的 (DE)

- A.药品广告内容超出国务院药品监督管理部门核准的药品说明书，但是客观真实
- B.药品广告含有表示功效的断言或者保证
- C.药品广告利用中国医学科学院的名义作证明
- D.非药品广告不得有涉及药品的宣传
- E.在某地方电视台播放某制药厂生产的 OTC 的广告

34.企业在从事药品研制、生产、经营、使用活动，应当保证全过程信息 (ABCDE)

- A.真实
- B.准确
- C.完整
- D.有价值性
- E.可追溯

35.药品监督管理部门设置或者制定的药品专业技术机构，承担依法实施药品监督管理所需的 (ABCDE)

- A.审评
- B.检验
- C.核查
- D.监测
- E.评价

36.从事药品研制活动，应当遵守的是 (AE)

- A.药物临床试验质量管理规范
- B.药物临床质量管理规范
- C.药品临床质量管理规范
- D.药品非临床研究质量管理规范
- E.药物非临床研究质量管理规范

37.开展药物非临床研究，应当有与研究项目相适应的是 (ABCDE)

- A.人员
- B.场地
- C.仪器
- D.管理制度
- E.设备

38.药品上市许可持有人是指 (DE)

- A.取得药品注册证书的主要负责人
- B.取得药品注册证书的法定代表人
- C.取得药品注册证书的质量负责人
- D.取得药品注册证书的企业
- E.取得药品注册证书的药品研制机构

39.下列药品活动适用于《药品管理法》的是 (ABCDE)

- A.研制
- B.生产
- C.经营
- D.使用
- E.监督管理

40.下列品种为药食同源的是 (ABDE)

A.枸杞子 B.乌梅 C.白术 D.青果 E.党参

41.药品经营企业应当采取下列哪些必要措施,从而保证药品质量 (ABCDE)

A.冷藏 B.防冻 C.防潮 D.防虫 E.防鼠

42.《药品管理法》所称药品包括 (ACD)

A. 中药 B.体外诊断制剂

C.化学药 D.生物制品

E.对照品

43.药品上市许可持有人依法对药品研制、生产、经营、使用全过程中负有的责任是 (ABD)

A.安全性 B.有效性

C.稳定性 D.质量可控性

E.可追溯性

44.有以下情形之一的,为劣药 (BCE)

A.变质的药品

B.被污染的药品

C.超过有效期的药品

D.药品所含成份与国家药品标准规定的成分不符

E.药品成份的含量不符合国家药品标准

45.根据《药品管理法》规定,药品生产企业编造生产、检验记录行为的处罚是 (ABCE)

A. 没收违法生产的药品和违法所得

B. 没收专门用于违法生产的原料、辅料、包装材料和生产设备

C. 责令停产停业整顿

D. 处违法生产的药品货值金额十倍以上二十倍以下的罚款

E. 处违法生产的药品货值金额十五倍以上三十倍以下的罚款

46.违反《药品管理法》规定,以下哪些行为将没收违法生产、销售的药品和违法所得以及包装材料、容器,责令停产停业整顿,并处以五十万元以上五百万元以下的罚款 (BDE)

A. 未经批准在药品生产过程中进行重大变更

B. 未经批准开展药物临床试验

C. 编造生产、检验记录

D. 使用未经核准的标签、说明书

E. 使用未经审批的直接接触药品的包装材料或者容器生产药品，或者销售该类药品

47.根据《药品管理法》规定，应按生产销售假药从重处罚的有 (BE)

A.王某以淀粉混入色素压片，铝塑板封装，再套以回收使用过的复方甘草片包装材料和说明书，冒充该药品销售至城乡结合部的药品零售企业

B.某公司回收人血白蛋白注射剂的包装，灌装生理盐水后，低价销售给无《医疗机构执业许可证》的“黑诊所”使用

C.某化工企业从事非法生产加工销售以老年人为主要使用人群的治疗高血压的药物

D.某药品销售企业因销售过期药品而受到处罚，数月后又将另一批过期药品修改生产批号和有效期后继续销售

E.某药品经营企业拒绝、逃避监督检查，伪造、销毁、隐匿有关证据材料

48.赵某在甲药店购买了由乙药厂生产的，某种说明书标注可治疗脂溢性皮炎的丙药膏。赵某买回家使用后，发现脂溢性皮炎越发严重。经药品研究部门认定，该丙药膏没有治疗脂溢性皮炎的功效，赵某遂向甲药店提出索赔。处理赵某索赔要求的做法，下列正确的是 (BC)

A. 甲药店不必赔偿赵某损失，并建议赵某向乙药厂索赔

B. 甲药店先行赔偿赵某损失，后向乙药厂依法追偿

C. 赵某的兒子向乙药厂除请求赔偿损失外，还请求乙药厂支付丙药膏金额的十倍赔偿金

D. 赵某的兒子除请求赔偿损失外，还请求乙药厂支付损失五倍的赔偿金

E. 乙药厂同意赔付赵某要求增加赔偿的 500 元人民币

49.从事药品生产活动，应当具备下列条件的是 (ABCDE)

A. 有依法经过资格认定的药学技术人员、工程技术人员及相应的技术工人

B. 有与药品生产相适应的厂房、设施和卫生环境

C. 有能对所生产药品进行质量管理和质量检验的机构、人员

D. 有必要的仪器设备

E. 有保证药品质量的规章制度

50.下列药品的标签、说明书应当印有国家规定专用标志的是 (ABDE)

A.麻醉药品、精神药品 B.医疗用毒性药品、放射性药品

B. 处方药 D.非处方药

E.外用药品

第二部分 药学专业知识 (600 道)

一、单选题

1. 中药药学服务的核心是 (C)

- A. 以人为本
- B. 提高生活质量
- C. 促进合理用药治疗
- D. 提高患者生命质量
- E. 保障药品供应

2. 关于中药药学服务的模式与内容的说法, 错误的是(B)

- A. 从“以药品为中心”转变为“以病人为中心”
- B. 为确保用药安全, 药师只需保持单纯的药品调剂工作
- C. 以合理用药为核心, 药师参与临床诊断
- D. 以重点加强药学专业技术服务、参与临床用药为中心
- E. 药师工作中需要协助医师选择治疗药物, 制定个体化给药方案

3. 执业药师的基本技能是指在提供药学服务的各个环节所必须具备的专业技术方法与工作能力。不属于执业药师基本技能的是(E)

- A. 处方审核
- B. 处方调剂
- C. 处方点评
- D. 用药咨询
- E. 药品配送

4. 现存最早的一部中医典籍, 也是中医学最重要的经典著作的是(C)

- A. 神农本草经
- B. 伤寒论
- C. 黄帝内经
- D. 金匱要略
- E. 本草纲目

5. 中国历史上第一部官修本草是 (A)

- A. 新修本草
- B. 神农本草经
- C. 重修本草
- D. 本草纲目
- E. 本草经集注

6. 药品价格、报销, 是否进入医疗保险报销目录等是以下哪个群体最关注的问题 (D)

- A. 医生
- B. 护士
- C. 药师
- D. 患者
- E. 以上全部

7. 活血化瘀药, 如桃核承气汤宜选择的服药时间是(C)

- A. 饭后服
- B. 清晨服
- C. 空腹服
- D. 睡前服
- E. 疾病发作时服

8. 对胃肠道有刺激的药物及苦寒伤胃之药宜选择的服药时间是(C)

- A. 空腹服
- B. 饭前服
- C. 饭后服

D.清晨服 E.睡前服

9.需要热服的药物是(D)

A.解毒药 B.止吐药 C.热证药

D.解表药 E.清热祛暑药

10.根据阴阳属性划分, 下列属于阳的是(E)

A.静止 B.内守 C.凝聚 D.滋润 E.无形

11.“寒极生热, 热极生寒” 体现的阴阳关系是(D)

A.阴阳对待 B.阴阳互用 C.阴阳消长

D.阴阳转化 E.阴阳制约

12.患者病机为阳偏盛, 其证候为(A)

A.实热证 B.虚热证 C.实寒证

D.虚寒证 E.寒热错杂证

13.阴偏盛者, 宜选用的治法为(B)

A.热者寒之 B.寒者热之 C.阴病治阳

D.阳病治阴 E.阴中求阳

14.根据五行的特性引申, 下列属于土的是(D)

A.生长 B.升发 C.升腾 D.生化 E.收敛

15.根据五行属性分类, 下列属于肝的是(A)

A.筋 B.脉 C.肉 D.皮 E.骨

16.“五脏六腑之大主” 指的是(B)

A.肝 B.心 C.脾 D.肺 E.肾

17.以下功能属于肺的是(E)

A.主纳气 B.主统血 C.主疏泄 D.主神明 E.主肃降

18.既属于六腑, 又属于奇恒之腑的是(C)

A.大肠 B.小肠 C.胆 D.三焦 E.脉

19.人体生命活动的原动力是(A)

A.元气 B.宗气 C.营气 D.卫气 E. 真气

22.调节控制汗孔的开合和汗液的排泄, 以维持体温相对恒定的气是(E)

A.元气 B.宗气 C.营气 D. 肺气 E.卫气

21.能够营养人体、化生血液的气是(C)

A.卫气

B.清气

- C.营气
- D.宗气
- E.元气

22.某男，2岁。囟门迟闭，手足软弱，智力低下。分析其病变的主要原因是(B)

- A.宗气虚
- B.元气虚
- C.营气虚
- D.胃气虚
- E.卫气虚

23. 称为“十二经脉之海”的经脉是(C)

- A.任脉
- B.督脉
- C.冲脉
- D.带脉
- E.阴维脉

24.根据十二经脉的交接规律，相为表里的阴经和阳经的交接部位是(B)

- A.头西部
- B.指趾端
- C.胸部
- D.腹部
- E.臀部

25. 称为“阳脉之海”的经脉是(B)

- A.带脉
- B.督脉
- C.任脉
- D.别络
- E.冲脉

26.十二经脉是气血运行的主要通道，按照十二经脉气血流注次序，足太阴脾经的气血流入(B)

- A.手太阴肺经
- B.手少阴心经
- C.足阳明胃经

- D.足少阴肾经
- E.手太阳小肠经

27.某女，32岁。喜静少动，性格内向。其体质类型应为(C)

- A.偏阳质
- B.湿热质
- C.偏阴质
- D.气郁质
- E.瘀血质

28.某男，23岁。畏热喜冷，喜动，易急躁。其体质类型应该为(E)

- A.偏阴质
- B.阴阳平和质
- C.痰湿质
- D.瘀血质
- E.偏阳质

29.人体分为阴阳平和质，偏阴质，偏阳质，其中偏阴质的特性有(D)

- A.能耐寒暑，适应力强
- B.大便干，小便发黄
- C.畏热喜冷，喜动好强
- D.舌质偏淡，脉多迟缓
- E.性格随和，唇色红润

30.具有“善行而数变”特点的六淫是(A)

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.暑邪
- E.火邪

31.某女，32岁，近期出现小便浑浊，白带过多，大便溏泻等症状，可导致该临床表现的邪气是(C)

- A.风邪
- B.寒邪
- C.湿邪
- D.暑邪

E.燥邪

32.根据七情内伤致病理论，惊可导致(E)

A.气上

B.气下

C.气消

D.气结

E.气乱

33.某男，32岁，胸闷脘痞，小便短涩，大便不爽，属于湿邪所致。其病因的性质是(D)

A.沉重秽浊

B.黏腻停滞

C.凝结阻滞

D.阻遏气机

E.收缩牵引

34.某女，57岁，恶寒发热，无汗，肢体屈伸不利，脉紧，属于寒邪所致。其病因的性质是(B)

A.黏腻停滞

B.收缩牵引

C.沉重秽浊

D.凝结阻滞

E.阻遏气机

35.某男，67岁。畏寒肢冷、面色白，小便清长，舌淡、脉迟。分析该病机是(B)

A.阳盛

B.阳虚

C.亡阳

D.阴盛

E.阴虚

36.身热反不恶寒，四肢厥逆，下利清谷，脉微欲绝，病机属(A)

A.阴盛格阳

B.阴阳互损

C.阴阳亡失

D.阳盛格阴

E.阴阳偏衰

37.某女，47岁。出现烦躁不宁，登高而歌，呼号怒骂，打人毁物等症状，其临床意义是(D)

A.少神

B.失神

C.无神

D.神乱

E.假神

38.某男，78岁。重病日久，原来面色十分晦暗，不欲言语、语声低弱、时断时续，突然开始言语不休，两颧发红如妆。其临床意义是(D)

A.失神

B.得神

C.神乱

D.假神

E.少神

39.食积、痰饮的常见舌苔是(D)

A.黄苔

B.白苔

C.燥苔

D.腻苔

E.花剥苔

40.目光晦暗、瞳仁呆滞、呼吸气微、反应迟钝、精神萎靡，其临床意义是(C)

A.有神

B.假神

C.失神

D.神乱

E.少神

41.胃火上炎，可见(E)

A.牙龈青紫

B.牙齿蛀蚀

C.牙龈淡白

D.齿稀根露

E.齿龈红肿

42.某女，23岁。长期饮食不规律，面色萎黄，食少纳呆，倦怠无力，伴有胃下垂。辨析其证候是(D)

A.寒湿困脾

B.脾不统血

C.脾肾阳虚

D.脾虚下陷

E.脾失健运

43.某男，65岁。头晕目眩，耳鸣耳聋，牙齿松动，口燥咽干，五心烦热，盗汗，腰膝酸痛，舌红，脉细数。辨析其证候是(A)

A.肾阴虚

B.肾气虚

C.肾阳虚

D.脾胃气虚

E.肾精不足

44.不属于虚证的临床症状是(A)

A.呼吸喘粗

B.精神萎靡

C.五心烦热

D.自汗盗汗

E.心悸气短

45.尿酸盐结晶常见于(A)

A.痛风

B.尿潴留

C.慢性肾病

D.肝硬化

E.慢性膀胱炎

46.对于主要表现为正气虚损，且邪气不盛的虚性病证，宜采用的治疗原则是(A)

A.单用扶正

B.单用祛邪

C.扶正与祛邪兼用

D.先扶正后祛邪

E.先祛邪后扶正

47.患者正虚邪实，正虚较急、重时，宜采用的治疗原则是(C)

A.单用扶正

B.先祛邪后扶正

C.扶正为主，兼顾祛邪

D.祛邪为主，兼顾扶正

E.单用祛邪

48.瘀血崩漏宜选用的治疗原则是(A)

A.先祛邪后扶正

B.先扶正后祛邪

C.单用祛邪

D.单用扶正

E.扶正与祛邪兼用

49.某男，46岁。体瘦乏力，久患虫积。宜选用的治疗原则是(D)

A.单用扶正

B.单用祛邪

C.扶正与祛邪兼用

D.先扶正后祛邪

E.先祛邪后扶正

50.某男，23岁。发热重，恶寒轻，干，口渴，鼻塞，流黄涕，咳嗽，痰黏。舌苔薄黄，脉浮数，宜采用的治法是(B)

A.辛温解表法

B.辛凉解表法

C.透疹解表法

D.滋阴解表法

E.益气解表法

51.某女，37岁。平素易外感，现头痛身热，微寒无汗，面色不华，唇甲色淡，心悸头晕，舌淡苔白，脉细。宜采用的治法是(E)

A.辛凉解表法

B.助阳解表法

C.益气解表法

D.滋阴解表法

E.养血解表法

52.患者误食毒物，被及时发现，此时宜采用的治法是(C)

A.峻下法

B.泻下逐水法

C.峻吐法

D.调和肠胃法

E.清热解毒法

53.针对血虚津枯、肠燥便秘证，宜采用的治法是(B)

A.寒下法

B.润下法

C.攻朴兼施法

D.泻下逐水法

E.调和肠胃法

54.针对邪犯少阳之证，症见寒热往来，胸胁苦满，不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩。舌苔薄白，脉弦者。宜采用的治法是(D)

A.回阳救逆法

B.攻补兼施法

C.益气解表法

D.和解少阳法

E.补气法

55.以下不属于下法的是(E)

A.润下法

B.泻下逐水法

C.攻补兼施法

D.寒下法

E.消食导滞法

56.某女，26岁。发热，恶风，鼻塞流黄涕，咳嗽。舌红，苔薄黄，脉浮数。诊断为感冒，证属风热感冒。宜选用的中成药是(D)

A.清瘟解毒片

B.通宣理肺丸

C.感冒软胶囊

D.桑菊感冒片

E.维 C 银翘片

57.某女, 36 岁。深秋时节因衣着较少, 自觉恶寒体温 37.8°C,症见头痛, 恶寒身痛, 鼻流清涕,咳嗽, 咽干。舌红苔薄白, 脉浮。宜选用的中成药是(D)

A.清瘟解毒片

B.柴银口服液

C.败毒散

D.感冒清热颗粒

E.银翘伤风胶囊

58.某女, 37 岁。连日来咳嗽频剧,症见发热恶寒,咳嗽, 痰黄, 口渴, 咽痛。舌边尖红, 苔薄黄, 脉浮数。诊断为咳嗽, 证属风热犯肺。宜选用的中成药是(C)

A.清肺化痰丸

B.复方鲜竹沥液

C.急支糖浆

D.橘贝半夏颗粒

E.二母宁嗽丸

59.某女,51 岁。咳嗽日久,干咳少痰,午后咳甚,五心烦热, 颧红, 耳鸣。舌红少苔, 脉细数辨析其证候是(E)

A.风寒袭肺证

B.风热犯肺证

C.风燥伤肺证

D.痰热郁肺证

E.肺阴亏耗证

60.某男,68 岁。咳嗽日久,干咳少痰,午后潮热,口燥咽干, 舌红少苔, 脉细数。宜选用的中成药是(A)

A.百合固金丸

B.二母宁嗽丸

C.二陈丸

D.清肺化痰丸

E.急支糖浆

61.某男, 76 岁。喘促气短,动则尤甚,呼多吸少,面唇青紫。舌质淡, 苔薄, 脉沉弱。宜选用的中成药是(E)

A.桂龙咳喘宁胶囊

- B.橘红痰咳颗粒
- C.葶贝胶囊
- D.清肺化痰丸
- E.补金片

62.喘证属风寒闭肺证宜选用的中成药是(E)

- A.橘红痰咳颗粒
- B.祛痰止咳颗粒
- C.复方鲜竹沥液
- D.清肺消炎丸
- E.小青龙胶囊

63.某男, 23 岁。由于天气骤然转凉, 近日出现喘咳气逆,呼吸急促,头痛无汗,恶寒发热,苔薄白而滑, 脉浮紧。宜选用的中成药是(A)

- A.桂龙咳喘宁胶囊
- B.桑菊感冒片
- C.二陈丸
- D.清肺化痰丸
- E.补金片

64.可参考喘证辨证论治的西医疾病是(D)

- A.上呼吸道感染
- B.多种神经症
- C.慢性肾脏疾病
- D.肺源性心脏病
- E.胃食管反流病

65.胸痹是指以胸部闷痛, 甚则胸痛彻背, 短气、喘息不得卧为主症的疾病。西医学上可参考胸痹辨证论治的是(B)

- A.慢性阻塞性肺疾病
- B.肺源性心脏病
- C.梅尼埃病
- D.癔症
- E.心源性哮喘

66.某男,47 岁。胸闷重而痛,痰多气短,肢体沉重,遇阴雨天而易发作或加重, 伴有倦怠乏力,咳吐痰涎。舌体胖大且边有齿痕, 苔浊腻, 脉滑。不宜选用的中成药是(B)

- A.血滞通胶囊
- B.心力丸
- C.丹菱片
- D.降脂通络软胶囊
- E. 舒心降脂片

67.胸痹属气滞血瘀证，宜选用的中成药是(B)

- A.芪参益气滴丸
- B.冠心丹参滴丸
- C.冠心生脉口服液
- D.洛布桑胶囊
- E.苏合香丸

68.某男，53岁。心悸不安，胸闷不舒，心痛时作，痛如针刺，唇甲青紫。舌质紫暗，脉涩。辨析其证候为(D)

- A.心脾两虚证
- B.阴虚火旺证
- C.心阳不振证
- D.瘀阻心脉证
- E.气阴两虚证

69.某男，56岁。心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少。舌淡红，脉细弱。宜选用的中成药是(B)

- A.天王补心丸
- B.益气养血口服液
- C.宁神补心片
- D.七叶神安片
- E. 柏子养心丸

70.某男，29岁。虚烦不眠，触事易惊，终日惕惕，胆怯心悸，伴气短自汗，倦怠乏力。舌淡，脉弦细。诊断为不寐，辨证为心胆气虚证。宜选用的中成药是(A)

- A.柏子养心丸
- B.礞石滚痰丸
- C.滋肾宁神丸
- D.泻肝安神丸
- E.复方罗布麻颗粒

71.某女，43岁。近半月心悸不安，伴胸闷气短，倦怠懒言，面色苍白，形寒肢冷，舌淡苔白脉虚弱。宜选用的中成药是(A)

- A.心宝丸
- B.朱砂安神丸
- C.天王补心丸
- D.宁神补心片
- E.归脾丸

72.某男，64岁。心悸易惊，五心烦热，口干盗汗，头晕目眩，急躁易怒。舌红少津，脉细数。宜选用的中成药是(C)

- A.消疲灵颗粒
- B.七叶神安片
- C.安神补心丸
- D.稳心颗粒
- E.参松养心胶囊

73.某女，21岁。夏日贪凉过食冷饮后出现泄泻清稀，脘闷食少，腹痛肠鸣，恶寒，发热。舌苔白腻，脉濡缓。宜选用的中成药是(E)

- A.人参健脾丸
- B.肠康片
- C.加味保和丸
- D.连蒲双清片
- E.藿香正气水

74.某男，50岁。泄泻腹痛，泻下急迫，势如水注，肛门灼热，粪色黄褐，气味臭秽，小便短黄。舌红，苔黄腻，脉滑数。宜采用的治法是(C)

- A.健脾益气，化湿止泻
- B.抑肝扶脾
- C.清热燥湿，分利止泻
- D.芳香化湿，解表散寒
- E.消食导滞，和中止泻

75.某男，21岁。近日饮食无度，出现腹泻，泻下伴有不消化食物，脘腹胀满，暖腐吞酸。舌淡红，苔厚腻，脉滑实。宜选用的中成药是(C)

- A.连蒲双清片
- B.桂附理中丸

- C.加味保和丸
- D.人参健脾丸
- E.痛泻宁颗粒

76.某男, 48岁。胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,空腹痛甚,神疲纳少,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄。舌淡苔白,脉虚弱。宜选用的中成药是(C)

- A.胃痛宁片
- B.朴沉化郁丸
- C.温胃舒胶囊
- D.加味保和丸
- E.仲景胃灵丸

77.六磨汤用于治疗便秘,适用证候是(A)

- A.气秘
- B.虚秘
- C.热秘
- D.冷秘
- E.劳秘

78.某男, 49岁。眩晕动则加剧,劳累即发,面色淡白,神疲乏力,唇甲不华,心悸少寐,纳少腹胀。舌淡苔薄白,脉细弱。中医辨证为(B)

- A.肝阳上亢证
- B.气血亏虚证
- C.肾精不足证
- D.痰湿中阻证
- E.心神失养证

79.某女, 40岁。头昏胀痛,两侧为重,心烦易怒,夜寐不宁,口苦面红,兼胁痛。舌红苔黄,脉弦。宜采用的治法是(E)

- A.养血滋阴,和络止痛
- B.活血化瘀,通窍止痛
- C.疏风清热和络
- D.疏风散寒止痛
- E.平肝潜阳

80.某女, 58岁,高血压病。眩晕,耳鸣,头目胀痛,口苦,失眠多梦,遇烦劳郁怒而加重,颜面潮红,急躁易怒。舌红苔黄,脉弦。辨析其证候为(C)

- A.肾精不足证
- B.气血亏虚证
- C.肝阳上亢证
- D.瘀血阻络证
- E.痰湿中阻证

81.某女，40岁。尿中夹有砂石，排尿涩痛，少腹拘急，尿中带血。舌质红，苔薄黄，脉弦数。诊断为淋证，宜采用的治法是(C)

- A.清热利湿通淋
- B.清热通淋，凉血止血
- C.清热利湿，排石通淋
- D.补脾益肾
- E.清热利湿，分清泄浊

82.某男，38岁。小便浑浊，如米泔水，上有浮油，置之沉淀，尿时热涩疼痛，口干。舌质红，苔黄腻，脉濡数。四诊合参，辨析其证候是(C)

- A.劳淋
- B.石淋
- C.膏淋
- D.血淋
- E.热淋

83.某女，49岁。郁怒之后，小便涩滞，淋漓不宣，伴有少腹胀满疼痛。舌苔薄白，脉弦。宜选用的中成药是(E)

- A.五淋丸
- B.草游分清丸
- C.五淋化石丸
- D.男康片
- E.柴胡舒肝丸

84.某男，69岁。小便点滴而下，甚则阻塞不通，烦躁口苦。舌质紫暗。舌苔黄腻，脉涩。宜采用的治法是(B)

- A.温肾助阳，化气行水
- B.行瘀散结，通利水道
- C.清热利湿，排石通淋
- D.温补肾阳，化气利水

E.健脾化湿，通阳利水

85.某男,58岁,二型糖尿病。小便频数,饮一溲一,咽于舌燥,面容憔悴,耳轮干枯,腰膝酸软,畏寒肢冷。舌淡,苔白少津,脉沉细无力。四诊合参,辨析其证候是(D)

A.气阴两虚证

B.肾阴亏虚证

C.脾胃气虚证

D.阴阳两虚证

E.阴虚燥热证

86.某女,40岁,患消渴。口渴引饮,能食与便溏并见,精神不振,四肢乏力。舌淡,苔薄白而干,脉细弱无力。宜采用的治法是(C)

A.滋养肾阴

B.养阴润燥

C.健脾益气

D.温阳滋肾

E.生津止渴

87.某女,49岁。烦渴引饮、消谷善饥,小便频数而多,尿浑而黄,形体消瘦。舌红,苔薄黄;脉滑数。诊断为消渴,辨证为阴虚燥热证。

宜选用的中成药是(A)

A.降糖胶囊

B.六味地黄丸

C.金匱肾气丸

D.参苓白术散

E.消渴丸

88.某男,31岁。精神抑郁,胸部闷塞,肋肋胀满,咽中如有物梗塞,咽之不下,咯之不出。舌苔白腻,脉弦滑。四诊合参,辨析其证候是(C)

A.心脾两虚证

B.阴虚燥热证

D.肝气郁结证

C.痰气郁结证

E.心神失养证

89.某男,21岁。低热,热势常随情绪波动而起伏,精神抑郁,肋肋胀满,烦躁易怒,口干而苦,纳食减少。舌红,苔黄,脉弦数。宜选用的中成药是(D)

- A.补中益气丸
- B.知柏地黄丸
- C.血府逐瘀口服液
- D.丹栀逍遥丸
- E.归脾丸

90.某女，44岁。腹部积块明显，质地较硬，固定不移，形体消瘦，纳谷减少，面色晦暗黧黑。舌质紫，有瘀斑，脉细涩。诊断为积聚，辨析其证候为（ C ）

- A.肝气郁结证
- B.正虚邪结证
- C.瘀血内结证
- D.肝络失养证
- E.肝胆湿热证

91.某男，42岁。有肝脾肿大病史，近日身体不适就医。症见腹中结块柔软，时聚时散，攻窜胀痛，腕肋胀闷不适。舌淡红，苔薄，脉弦。诊断为积聚，辨证为肝气郁结证，宜选用的中成药是（ A ）

- A.木香顺气丸
- B.鳖甲煎丸
- C.化癥回生片
- D.和络舒肝胶囊
- E.慢肝养阴胶囊

92.某男，42岁。肢体关节、肌肉疼痛酸楚，关节屈伸不利，涉及肢体多个关节，疼痛呈游走性。舌苔薄白，脉浮。诊断为痹证，宜选用的中成药是（ A ）

- A.九味羌活丸
- B.妊娠颗粒
- C.天麻丸
- D.独活寄生丸
- E.风湿定片

93.某男，39岁。暑湿阴雨天气，腰部疼痛，重着而热，活动后可减轻，身体困重，小便短赤。舌质红，苔黄腻，脉濡数。诊断为腰痛，宜选用的基础方剂是（ B ）

- A.身痛逐瘀汤
- B.四妙丸
- C.甘姜苓术汤

D.右归丸

E.左归丸

94.某男，51岁。患风湿性关节炎多年，刻下肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁。舌质淡，舌苔白腻，脉濡缓。宜选用的中成药是（ C ）

A.天麻丸

B.九味羌活丸

C.四妙丸

D.狗皮膏

E.济生肾气丸

95.某女，19岁。夏日与同学户外游玩，刻下发热汗多，头痛面红，烦躁，胸闷，口渴多饮，溲赤。舌红少津，脉洪大。诊断为中暑，辨证为阳暑。宜选用的中成药是（ A ）

A.清暑解毒颗粒

B.藿香正气水

C.暑症片

D.暑湿感冒颗粒

E.荆防颗粒

96.某女，33岁。平素喜食辛辣，疖肿发于发际处此愈彼起，伴发热，口渴，溲赤，便秘。舌苔黄，脉数。宜选用的中成药是（ A ）

A.连翘败毒丸

B.皮肤病血毒丸

C.牛黄化毒片

D.知柏地黄丸

E.泻青丸

97.某女，25岁。乳汁郁积结块，皮色微红，肿胀疼痛，伴恶寒发热，周身酸楚，口渴，便秘。舌苔薄，脉数。辨析其证候是（ D ）

A.热毒炽盛

B.冲任失调

C.胃肠湿热

D.气滞热壅

E.肝郁痰凝

98.某女,20岁。丘疹色红,微有痒痛,伴口渴喜饮,大便秘结,小便短赤。舌质红,苔薄黄,脉弦滑。宜选用的中成药是 (A)

- A.化癥祛斑胶囊
- B.金花消痤丸
- C.清热暗疮片
- D.当归苦参丸
- E.防风通圣丸

99.某女,26岁。患内痔,便血色鲜红,量较多肛内有肿物外脱,可自行回缩,伴肛门灼热,溲赤。舌质红,苔黄腻,脉弦数。辨析其证候是 (A)

- A. 湿热下注
- B.风伤肠络
- C.脾虚气陷
- D.痰湿瘀滞
- E.气滞血瘀

100.某男,31岁。阳痿不振,伴心悸易惊,胆怯多疑夜多噩梦,有被惊吓史。舌苔薄白,脉弦细。诊断为阳痿,证属惊恐伤肾。宜选用的中成药是 (B)

- A.强龙益肾胶囊
- B.补肾安神口服液
- C.人参归脾丸
- D.益肾灵颗粒
- E.补肾康乐胶囊

101.月经周期提前,量多,色淡红,质清稀;神疲乏力,气短懒言,小腹空坠,纳少便溏。舌淡,苔薄白,脉细弱。中医辨证为 (E)

- A.肾虚证
- B.血虚证
- C.阴虚证
- D.肝郁证
- E.脾气虚证

102.某女,26岁。月经周期延后,量少,色暗淡,质清稀 暖膝酸软,头晕耳鸣,面色晦暗。舌淡,苔薄白,脉沉细。宜选用的中成药是 (C)

- A.复方益母草膏
- B.当归丸

- C.天紫红女金胶囊
- D.益母丸
- E.加味八珍益母膏

103.某女，56岁。围绝经期综合征，月经紊乱心烦易怒，懊恼不安，坐卧不宁，哭笑无常，夜卧多梦善惊，口干渴饮，尿黄便燥。舌质红苔薄黄，脉弦细而数。直选用的基础方剂是（ B ）

- A.右归九加减
- B.百合地黄汤加减
- C.一贯煎加减
- D.四君子汤加减
- E.逍遥散加减

104.某女，38岁，带下量明显增多，色黄呈脓性质黏有臭气，外阴瘙痒，小腹作痛，口苦口腻，胸闷纳呆，小便短赤。舌红，苔黄腻，脉滑数。中医辨证为（ E ）

- A.脾虚湿盛证
- B.阴虚火旺证
- C.肾阳亏虚证
- D.肝郁肾虚证
- E.湿热下注证

105.某女，4岁。近日不思饮食，暖腐酸馊，腹胀，腹痛，腹泻，舌红，苔黄腻，脉滑数。诊断为积滞，辨证为乳食内积证。直选用的中成药是（ C ）

- A.健胃消食片
- B.健儿消食口服液
- C.四磨汤口服液
- D.启脾丸
- E.小儿胃宝丸

106.某男，3岁。近日不思饮食，大便溏薄夹不消化食物，肢倦乏力，面色萎黄，形体偏瘦，舌淡，苔薄白，脉无力。诊断为厌食，辨证为脾胃气虚证。直选用的中成药是（ B ）

- A.小儿化食丸
- B.启脾丸
- C.复方消食茶
- D.健儿消食口服液

E.小儿胃宝丸

107.患儿，2岁。厌恶进食，胸脘痞闷，暖气泛恶，大便不调，形体尚可。舌淡红，苔薄腻，脉尚有力。中医辨证为（D）

A.乳食内积证

B.脾虚夹积证

C.脾胃气虚证

D.脾失健运证

E.脾胃阴虚证

108.某患儿，3岁。不思进食，食不知味，神倦多汗，大便溏薄夹不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力。舌淡，苔薄白，脉缓无力。宜采用的治法是（C）

A.调和脾胃，运脾开胃

B.消乳化食，和中导滞

C.健脾益气，佐以助运

D.滋脾养胃，佐以助运

E.健脾助运，消食化滞

109.某男，6岁。口干多饮，纳呆食少，面黄肌瘦四肢倦怠，精神不振，体虚多汗、大便干结。舌红少苔，脉细。诊断为厌食，证属脾胃阴虚。宜选用的中成药是（A）

A.儿宝颗粒

B.复方消食茶

C.启脾丸

D.健胃消食片

E.保和丸

110.某患儿，8岁。近日不思饮食，脘腹胀满，口渴大便干燥。舌红，苔黄厚腻，脉弦滑。诊断为积滞，证属乳食内积。宜选用的中成药是（D）

A.参苓白术散

B.儿宝颗粒

C.启脾丸

D.小儿化食丸

E.健胃消食片

111.某男，30岁。咽部疼痛伴见发热恶风，头痛咳嗽痰黄，吞咽时疼痛加剧，颌下有髂核。舌红，苔黄，脉浮数。诊断为咽喉肿痛，辨证为风热外袭证。宜选用

的基础方剂是（ C ）

- A.龙胆泻肝汤
- B.知柏地黄丸
- C.疏风清热汤
- D.附子理中丸
- E.益气聪明汤

112.咽喉肿痛属风热外袭证，宜选用的中成药是（ D ）

- A.金参润喉合剂
- B.金匱肾气丸
- C.六神丸
- D.金嗓开音丸
- E.右归丸

113.咽喉肿痛属火毒上攻证，宜选用的中成药是（ C ）

- A.复方鱼腥草片
- B.附子理中丸
- C.六神丸
- D.知柏地黄丸
- E.龙胆泻肝丸

114.某男,38岁。咽部红肿,灼热痒痛,咽内异物感,口鼻干燥,干咳少痰。舌红少津,脉细数。诊断为咽喉肿痛,证属虚火上炎。宜选用的中成药是（ B ）

- A.清咽利膈丸
- B.玄麦甘桔含片
- C.板蓝根颗粒
- D.复方鱼腥草片
- E.六神丸

115.某女,38岁。近日鼻塞,鼻涕浓浊而最多,嗅觉减退,烦躁易怒,口苦,咽干。舌红,苔黄腻,脉弦数。诊断为鼻渊,辨证为胆经郁热证。宜选用的中成药是（ A ）

- A.鼻渊舒胶囊
- B.利鼻片
- C.鼻渊片
- D.鼻渊通窍颗粒
- E.鼻舒适片

116.某男，57岁。耳鸣日久，耳鸣声低，遇疲劳加重，倦怠乏力，纳差便溏。舌淡，苔白，脉细弱。诊断为耳鸣耳聋，辨证为脾胃虚弱证。宜选用的中成药是（ C ）

- A.耳聋左慈丸
- B.知柏地黄丸
- C.补中益气丸
- D.龙胆泻肝丸
- E.银翘解毒丸

117.具有清热解毒，益肝养胃，明目醒神，愈疮，滋补强身功能的藏药是（ D ）

- A.洁白丸
- B.大月晶丸
- C.八味沉香散
- D.仁青芒觉
- E.仁青常觉

118.藏医“三因”包括（ A ）

- A.隆、赤巴、培根
- B.火、风、空
- C.骨、肉、血
- D.稠、稀、汗
- E.涕、唾、津

119.具有清心热、养心、安神、开窍的功能，用于热病攻心、神昏谵语的藏成药是（ B ）

- A.五味麝香丸
- B.八味沉香散
- C.六味安消散
- D.洁白丸
- E.十味黑冰片丸

120.蒙医中的“三秽”指的是（ C ）

- A.赫依、希日、巴达干
- B.血、脂、白精
- C.稠、稀、汗
- D.涕、唾、津
- E.汗、涕、大便

121.根据蒙医传统用药的“服药十则”，止逆药的服用时间是（ C ）

- A.食间服
- B.食前服
- C.与食混服
- D.睡前服
- E.央食服

122.根据蒙医传统用药的“服药十则”，驱虫药的服用时间是（ D ）

- A.食前服
- B.食间服
- C.睡前服
- D.早晨空腹服
- E.药食交替

123.属于处方后记的是（ C ）

- A.开具日期
- B.药品规格
- C.药品金额
- D.住院病历号
- E.药品名称

124.中药调剂流程一般可分为审方、计价、调配、复核和发药五个部分。执业药师调剂处方时必须做到“四查十对”，以下不属于“四查”内容的是（ D ）

- A.查处方
- B.查药品
- C.查配伍禁忌
- D.查药名
- E.查用药合理性

125.下列与药名有关的术语，属于对产地有要求的是（ B ）

- A.炒山药
- B.东阿胶
- C.香白芷
- D.明天麻
- E.远志去心

126.属于对饮片新陈提出要求的是（ B ）

- A.香白芷
- B.陈香椽
- C.广藿香
- D.怀山药
- E.左牡蛎

127.处方泻心汤(组成:大黄、黄连、黄芩)中的黄连应付 (A)

- A.生黄连
- B.酒黄连
- C.姜黄连
- D.萸黄连
- E.炒黄连

128.下列说法错误的是 (D)

- A.处方一般当日有效
- B.发现严重不合理用药或者用药错误，应拒绝调剂
- C.药师不应擅自涂改医师处方所列的药味:剂量、处方旁注
- D.由开具处方的医师注明有效期，但最长不得超过 2 天
- E.认真审查处方各项内容，包括处方前记、正文、后记是否清晰完整

129.关于中药处方书写要求的说法，错误的是 (A)

- A.中药饮片处方的剂数应当以“包”为单位
- B.应当体现“君、臣、佐、使”的特点要求
- C.原则上应当以克(g)为单位
- D.对饮片的产地、炮制有特殊要求的，应当在药品名称之前写明
- E.中药饮片有配伍禁忌和超剂量使用时，应当在药品上方再次签名

130.关于中成药处方书写要求的说法，错误的是 (E)

- A.每张处方不得超过 5 种药品
- B.功能相同或基本相同的不宜叠加使用
- C.用法用量应按照药品说明书规定的常规用法用量使用
- D.特殊情况需超剂量使用时，应当注明原因并再次签名
- E.中药注射剂不需要单独开具处方

131.中药饮片正名是规范化的饮片名称，除正名以外的名称为别名。“百部”的别名是 (B)

- A.天门冬

- B.野天门冬
- C.明门冬
- D.麦门冬
- E.寸冬

132. “金不换”的正名是（ E ）

- A.茜草
- B.鸡血藤
- C.红花
- D.大血藤
- E.三七

133.中药“拳参”的别名，正确的是（ A ）

- A.紫参
- B.丹参
- C.紫丹参
- D.党参
- E.东沙参

134.服用“蜜”忌食（ B ）

- A.韭菜
- B.生葱
- C.苋菜
- D.陈醋
- E.鳖肉

135.服用滋补药如人参时，需忌食的是（ E ）

- A.油
- B.酒
- C.鱼
- D.羊
- E.茶

136.下列说法错误的是（ E ）

- A.水银畏砒霜
- B.丁香畏郁金
- C.甘草反甘遂

D.人参畏五灵脂

E.甘草反白芍

137.有无证候禁忌是处方审核的一项重要内容根据中鼓证候禁忌理论，以下错误的是（ C ）

A.脾胃虚寒、大便稀溏者忌用苦寒药

B.高血压慎用麻贵

C.湿盛胀满者忌用马兜铃

D.哺乳期妇女不宜大量使用麦芽

E.阴虚火旺者忌用温热药

138.宜放在斗架最低层大药斗的药组是（ A ）

A.芦根与白茅根

B.党参与甘草

C.苍术与白术

D.赭石与紫石英

E.青风藤与海风藤

139.宜放在斗架高层的药组是（ C ）

A.荷叶与荷梗

B.灯心草与通草

C.白梅花与佛手花

D.寒水石与海蛤壳

E.茵陈与金钱草

140.属于常用药物，宜放在斗架的中上层的药组是（ E ）

A.谷精草与木贼草

B.千年健与五加皮

C.黄芩炭与黄柏炭

D.竹茹与丝瓜络

E.香附与延胡索

141.因存在“十八反”配伍禁忌，不能装于同一药斗或上下药斗的药组是（ D ）

A.韭菜子与葱子

B.附子与白附子

C.麻黄与麻黄根

D.藜芦与人参

E.阿魏与鸡矢藤

142.根据斗谱编排还应参考的其他原则，因外观性状相似但功效不同，不宜排列在一起的饮片有（ B ）

A.桃仁与红花

B.山药与天花粉

C.丁香与郁金

D.知母与贝母

E.麻黄与麻黄根

143.因存在“十九畏”配伍禁忌，不能装于同-药斗或上下药斗的药组是（ D ）

A.升麻与葛根

B.麻黄与麻黄根

C.小茴香与橘核

D.附子与犀角

E.附子与白附子

144.药名相近但性味功效不同，不应排列在一起的饮片是（ E ）

A.羌活与独活

B.麦冬与天冬

C.川乌与草乌

D.火麻仁与郁李仁

E.附子与白附子

145.关于处方应付的说法，错误的是（ E ）

A.白术应调配麸炒品

B.酸枣仁应调配清炒品

C.鳖甲应调配烫制品

D.益智仁应调配盐炙品

E.枇杷叶应调配炭制品

146.处方直接写药名(或炒)，需调配醋炙品的是（ B ）

A.枳壳

B.延胡索

C.地榆

D.金礞石

B.何首乌

147.关于药味调配操作，错误的是（ B ）

- A.每剂的重量误差应控制在士 5% 以内
- B.黏度大的饮片如瓜蒌、熟地黄等应先称
- C.体积松泡而量大的饮片如通草、灯心草等应先称
- D.一方多剂应按“等量递减”、“逐剂复戥”的原则
- E.矿物类、动物贝壳类、果实种子类药品需碾碎、捣碎后再分剂量调配

148.因质地坚硬，应打碎先煎 15 分钟的饮片是（ E ）

- A.制附子
- B.鱼腥草
- C.枇杷叶
- D.紫河车
- E.石决明

149.因含糖量比较多，在贮存过程中易泛油的饮片是（ B ）

- A.桃仁
- B.牛膝
- C.山药
- D.麻黄
- B.芒硝

150.中药在贮藏过程中，由于受到诸多因素的影响，其质量也会不断发生变化。

对中药质盘变异有影响的环境因素是（ C ）

- A.湿度、虫害、油脂
- B.油脂、淀粉、色素
- C.日光、湿度、霉菌
- D.树脂、霉菌、淀粉
- E.树脂、水分、包装

151.稻芽性平，除消食和中外，还能（ C ）

- A.活血散瘀
- B.降气化痰
- C.健脾开胃
- D.固精止遗
- E.回乳，疏肝

152.既能消食除胀，又能降气化痰的药是(D)

- A. 麦芽
- B. 鸡内金
- C. 稻芽
- E. 神曲

153.既消食，又和胃，治外感表证兼食积尤佳的药是(A)

- A. 神曲
- B. 莱菔子
- C. 稻芽
- D. 鸡内金
- E. 麦芽

154.鸡内金除固精止遗外，还能(A)

- A. 运脾消食
- B. 降气化痰
- C. 健脾开胃
- D. 活血散瘀
- E. 回乳，疏肝

155.使君子除杀虫外，又能(E)

- A. 止血
- B. 截疟
- C. 利水
- D. 行气
- E. 消积

156.味甘，性平。能治绦虫病、蛔虫病、钩虫病、血吸虫病的药是(A)

- A. 南瓜子
- B. 使君子
- C. 雷丸
- D. 榧子
- E. 鹤草芽

157.某男，22岁。患钩虫病，近日又见头癣、疥疮，治当杀虫，疗癣。宜选用的药是(C)

- A. 南瓜子
- B. 贯众

- C.苦楝皮
- D.雷丸
- E.鹤草芽

158.贯众味苦，性微寒，有小毒。其主治病证不包括(C)

- A. 风热感冒
- B. 温毒斑疹
- C.风寒感冒
- D.血热吐血
- E.预防流感

159.川芎上行头颠，下走血海，内行血气，外散风寒。其功效是(A)

- A.活血行气，祛风止痛
- B. 凉血清心，利胆退黄
- C.清心除烦，凉血消痈
- D.凉血解毒，解郁安神
- E.凉血止血，清热利湿

160.醋制可增强止痛的作用,具有活血、行气、止痛功效的药是(A)

- A. 延胡索
- B. 丹参
- C.西红花
- D.红花
- E.月季花

161.某女，23岁。患风湿痹痛3年，近日经常熬夜而致面色萎黄、月经不调，证属血虚，直选用的药是(E)

- A. 血竭
- B. 郁金
- C 大血藤
- D. 丹参
- E.鸡血藤

162.某女，40岁。患闭经6个月，近日又见虫积腹痛，直选用的药是(A)

- A. 干漆
- B. 南瓜子
- C.水蛭

D. 使君子

E. 土鳖虫

163.既能破血行气，又能通经止痛的药是(D)

A. 生姜

B. 炮姜

C. 干姜

D. 姜黄

E. 高良姜

164.水蛭的功效是(A)

A. 破血逐瘀，通经

B. 破血祛瘀，杀虫

C. 破血逐瘀，续筋接骨

D. 破血通经，消食化积

E. 活血止痛，消肿生肌

165.既能平肝清热，又能降血压、利水的药是(D)

A. 臭梧桐

B. 吴茱萸

C. 赭石

D. 罗布麻叶

E. 牡蛎

166.石决明清泄兼补，略兼益阴，除平肝潜阳外，还能(B)

A. 润肠通便

B. 清肝明目

C. 安神定惊

D. 制酸止痛

E. 软坚散结

167.某女，40岁。患胃痛泛酸4年，近日又见崩漏，带下，宜选用的药是(C)

A. 白芷

B. 秦皮

C. 牡蛎

D. 赭石

E. 蒺藜

168.某男, 34 岁。症见头晕目眩、目赤翳障, 证属肝阳上亢、肝火上攻, 宜选用的药是(A)

- A.石决明
- B. 石菖蒲
- C.罗布麻叶
- D. 枸杞子
- E. 蝉蜕

169.某女,39 岁。患失眠惊悸 3 年,近日又患湿疹宜选用的药是(D)

- A. 朱砂
- B.合欢皮
- C.石决明
- D.珍珠母
- E. 牡蛎

170.羚羊角除平肝息风外, 还能(A)

- A.凉血解毒
- B.祛风通络
- C.通络止痛
- D.化痰散结
- E.攻毒散结

171.某女, 27 岁。患痹痛肢麻 3 年, 近日又见尿闭不通, 宜选用的药是(C)

- A. 僵蚕
- B.天麻
- C.地龙
- D.全蝎
- E.蜈蚣

172.某女, 41 岁。患瘰疬痰核 2 年, 近日又见中风面瘫, 宜选用的药是(A)

- A.僵蚕
- B. 羚羊角
- C.地龙
- D.全蝎
- E.天麻

173.蜈蚣的功效是(A)

- A.息风止症，攻毒散结，通络止痛
- B.息风止痉，祛风止痛，化痰散结
- C.清热息风，平喘，通络，利尿
- D.息风止痉，平抑肝阳，祛风通络
- E.平肝息风，清肝明目，凉血解毒

174.治疗肝风抽搐，中风瘫痪，偏正头痛，风湿顽痹，宜选用的药组是(B)

- A.天麻配钩藤
- B.全蝎配蜈蚣
- C.硫黄配大黄
- D.牛黄配珍珠
- E.桑叶配菊花

175.苏合香性温，除开窍外，还能(E)

- A. 清热止痛
- B.消肿散结
- C.活血通经
- D.活血行气
- E.辟秽止痛

176.安息香性平，除开窍辟秽外，还能(D)

- A.补血止血
- B.益气养血
- C.活血补血
- D.活血行气
- E. 除湿止痛

177.麝香的用量是(D)

- A.0.1 ~ 0.3g
- B.0.15 ~ 0.35g
- C.0.1~ 0.5g
- D.0.03 ~0.1g
- E.0.6 ~ 1.5g

178.石菖蒲的主治病证不包括(E)

- A. 健忘恍惚
- B. 噤口痢

- C. 耳鸣耳聋
- D. 心悸失眠
- E. 产后血晕

179. 某男，31岁。近日与朋友吃麻辣火锅而致口舌生疮、咽喉肿痛，昨日又与家人发生剧烈争吵而见胸痹心痛，宜选用的药是(D)

- A. 石菖蒲
- B. 牛黄
- C. 苏合香
- D. 冰片
- B. 安息香

180. 既治热病神昏、气郁暴厥，又治癥痕闭经、难产死胎的药是(C)

- A. 苏合香
- B. 王不留行
- C. 麝香
- D. 蟾酥
- E. 安息香

181. 既能开窍醒神，又能活血通经、消肿止痛的(B)

药是

- A. 牛黄
- B. 麝香
- C. 远志
- D. 苏合香
- E. 冰片

182. 既能发泡止痛，又能攻毒杀虫的药是(C)

- A. 大蒜
- B. 硼砂
- C. 毛茛
- D. 儿茶
- E. 猫爪草

183. 某女，35岁。素患血瘀闭经，近日检查又见癥痕，宜选用的药是(A)

- A. 斑蝥
- B. 蟾酥

- C.马钱子
- D.升药
- E.升麻

184.某男，35岁。素患龋齿疼痛，近日又见痧胀腹痛吐泻，宜选用的药是(C)

- A.青木香
- B.芫荽
- C.蟾酥
- D.甘松
- E.轻粉

185.某男，37岁。素患疮疡溃烂不敛，近日又患烂弦风眼，宜选用的药是(C)

- A.蝉蜕
- B.木贼
- C.炉甘石
- D.珍珠
- E.密蒙花

186.某男，49岁。患外伤出血、肺热咳嗽，宜选用的药是(A)

- A.儿茶
- B.硼砂
- C.地榆
- D.小蓟
- E.血余炭

187.桂枝合剂除解肌发表外，又能(C)

- A.解热止痛
- B.宣肺止咳
- C.调和营卫
- D.散寒除湿
- E.化湿和中

188.某女，30岁。症见恶寒发热、无汗、头项强痛、鼻流清涕、咳嗽、痰白稀，证属风寒表实。宜选用的成药是(D)

- A.连花清瘟胶囊
- B.桂枝合剂
- C.保济丸

D.表实感冒颗粒

E.桑菊感冒片

189.某男，46岁。症见发热、咳嗽、咽痛。治当疏风解表，清热解毒，宜选用的成药是(B)

A.藿香正气水

B.双黄连颗粒

C.羚羊感冒胶囊

D.九味羌活丸

E.参苏丸

190.某女，65岁。患流行性感冒，症见发热、恶寒、头痛、肌肉酸痛，证属热毒袭肺。宜选用的成药是(A)

A.连花清瘟胶囊

B.藿香正气水

C.午时茶颗粒

D.感冒清热颗粒

E.银翘解毒丸

191.九味羌活丸除疏风解表外，又能(E)

A.理气和中

B.解热止痛

C.祛痰止咳

D.清热解毒

E.散寒除湿

192.午时茶颗粒除祛风解表外，又能(E)

A.调和营卫

B.清热除湿

C.宣肺止咳

D.解热止痛

E.化湿和中

193.某女，42岁。患胃肠型感冒，症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻，证属外感风寒，内伤湿滞。宜选用的成药是(A)

A.藿香正气水

B.九味羌活剂

- C.保济丸
- D.荆防颗粒
- E.午时茶颗粒

194.某男，51岁。症见发热头痛、腹痛腹泻、恶心呕吐、肠胃不适，医师诊为暑湿感冒。治当解表，祛湿，和中，宜选用的成药是(D)

- A. 参苏丸
- B.桑菊感冒片
- C.荆防颗粒
- D.保济丸
- E.桂枝合剂

195.某女，72岁。素体虚弱，近日感受风寒，症见恶寒发热、头痛鼻塞、咳嗽痰多、胸闷呕逆、气短乏力。宜选用的成药是(B)

- A. 羚羊感冒片
- B. 参苏丸
- C.桂枝合剂
- D.保济丸
- E.荆防颗粒

196.某女，47岁。因外感风寒挟湿导致感冒，医师处荆防颗粒治疗。其除解表散寒外，又能(C)

- A.益气祛痰
- B. 清热解毒
- C.祛风胜湿
- D.宣肺泄热
- E. 调和营卫

197.川贝止咳露的功能是(B)

- A. 利气平喘
- B.止嗽祛痰
- C.宣肺止咳
- D.敛肺止咳
- E. 解表化饮

198.某女，20岁。患急性支气管炎，症见咳嗽、发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛，证属外感风热。宜选用的成药是(A)

- A. 急支糖浆
- B. 降气定喘丸
- C. 杏苏止咳颗粒
- D. 苏子降气丸
- E. 养阴清肺膏

199. 某男, 63 岁。症见咳嗽经久不愈、痰少而黄, 证属痰热伤肺。宜选用的成药是(E)

- A. 降气定喘丸
- B. 止嗽定喘口服液
- C. 二母宁嗽丸
- D. 通宣理肺丸
- E. 强力枇杷露

200. 某女, 52 岁。患咳嗽, 症见痰黄而黏不易咳出、胸闷气促、久咳不止、声哑喉痛, 证属燥热蕴肺。宜选用的成药是(B)

- A. 小青龙胶囊
- B. 二母宁嗽丸
- C. 杏苏止咳颗粒
- D. 强力枇杷露
- E. 急支糖浆

201. 小青龙颗粒除止咳平喘外, 又能(C)

- A. 温肾纳气
- B. 辛凉宣泄
- C. 解表化饮
- D. 降气化痰
- E. 止嗽定喘

202. 苏子降气丸除降气化痰外, 又能(E)

- A. 涩精止遗
- B. 止嗽定喘
- C. 滋阴清肺
- D. 益气固表
- E. 温肾纳气

203. 某女, 29 岁。素患湿痹腰痛、湿疹, 近日又患寒湿带下, 宜选用的药是(E)

- A.砒石
- B.雄黄
- C.椿皮
- D.铅丹
- E. 蛇床子

204.二母宁嗽丸除化痰止咳外，又能(D)

- A.敛肺止咳
- B.解表化饮
- C.涤痰祛瘀
- D.清肺润燥
- E. 化痰通便

205.某男，37岁。症见久咳喘促、胸闷气短、遗精盗汗、小便频数，证属肾不纳气。宜选用的成药是(B)

- A. 二母宁嗽丸
- B.七味都气丸
- C.蛤蚧定喘丸
- D.降气定喘丸
- E. 苏子降气丸

206.止嗽定喘口服液除辛凉宣泄外，又能(C)

- A.宣肺止咳
- B. 益气固表
- C 清肺平喘
- D.涤痰祛瘀
- E.温肾纳气

207.某女，39岁。症见虚劳久咳、气短烦热、胸满郁闷、自汗盗汗，证属肺肾两虚、阴虚肺热。宜选用的成药是(E)

- A. 降气定喘丸
- B.二母宁嗽丸
- C.七味都气丸
- D.苏子降气丸
- E.蛤蚧定喘丸

208.固本咳喘片除健脾补肾外，又能(D)

- A. 清肺平喘
- B. 宣肺止咳
- C. 温肾纳气
- D. 益气固表
- E. 涤痰祛瘀

209. 大蓟性凉，为治血热出血之要药。其除凉血止血外，又能(C)

- A. 清肝泻火
- B. 解毒鼓疮
- C. 散瘀消痈
- D. 清热安胎
- E. 祛痰止咳

210. 小蓟性凉，尿血、血淋用之尤佳，其功效是(E)

- A. 凉血止血，祛疾止咳
- B. 化瘀止血，活血定痛
- C. 凉血止血，解毒敏疮
- D. 活血祛瘀，利尿通便
- E. 凉血止血，散瘀消痈

211. 炮姜味苦、辛，性热，其主治是(C)

- A. 湿疹瘙痒
- B. 痔疮出血
- C. 虚寒性崩漏
- D. 手足皲裂
- E. 蜂蝎螫伤

212. 温经止血宜炒炭用，散寒止痛宜生用的药是(D)

- A. 生姜
- B. 紫珠叶
- C. 藕节
- D. 艾叶
- E. 羌花

213. 既能收敛止血，又能止带止痢的药是(A)

- A. 鸡冠花
- B. 紫珠叶

- C.藕节
- D. 棕榈炭
- E.血余炭

214.藕节和棕榈炭的共同功效是日齷湊惜化瘀止血(E)

- A 凉血止血
- B.化淤止血
- C.温经止血
- D.补血止血
- E.收敛止血

215.紫珠叶除收敛凉血止血外，还能.(B)

- A.止带，止痢
- B 散瘀解毒消肿
- C.止痢，微疔
- D.消肿生肌
- E.宁心安种

216.血余炭性平，其主治是(A)

- A.血淋
- B.脱力劳伤
- C. 疟疾
- D.血热脱发
- E. 烫伤

217.薤白性温，除行气导滞外，又能(C)

- A. 杀虫疗癣
- B. 调经止痛
- C.通阳散结
- D.和血止痛
- E.疏肝理气

218.玫瑰花性温，除行气解郁外，还能(E)

- A.除烦止呕
- B.透疹止痒
- C.除湿止痛
- D.润肺止咳

E.和血止痛

219.能发汗解表，宣肺平喘，利水消肿，善治风水水肿、痹痛、阴疽的药是(B)

A. 紫苏

B. 麻黄

B. 香薷

C. 牛蒡子

D. E.桔梗

220.某女，31岁。素患经寒血滞所致月经不调,痛经，近日又见阳虚之心悸。治当温通经脉，助阳化气，宜选用的药是(D)

A. 香附

B.紫苏

C.麻黄

D.桂枝

E. 生姜

221.麻黄和香薷均能发汗解表，利水消肿。此外，香薷还具有的功效是(A)

A. 和中化湿

B.宣肺平喘

C.助阳化气

D.温通经脉

E. 燥湿行气

222.某女，29岁。素患脾胃气滞，怀孕后更觉胃肠不舒，脘腹胀满。宜选用的药是(B)

A. 生姜

B. 紫苏

C.荆芥

D.防风

E.香薷

223.荆芥除散风发表，透疹止痒，又能(E)

A. 安胎

B.助阳

C.止呕

D. 胜湿

E. 止血

224.某男，27岁。患肺热咳嗽，咯痰不畅一周，昨日又因食用过量香辣小龙虾而致热毒疮肿，大便秘结，小便不利。宜选用的药是(B)

A. 蝉蜕

B. 牛蒡子

C. 薄荷

D. 蔓荆子

E. 葛根

225.桑叶和菊花均能疏散风热，平肝明目。与桑叶相比，菊花又能(B)

A. 凉血止血

B. 清热解毒

C. 宣肺利咽

D. 燥湿化痰

E. 益胃生津

226.某女，31岁。半年来肝阳眩晕，患肺热燥咳，近日又因食用过量芒果而致血热吐血。宜选用的药是(C)

A. 牛蒡子

B. 菊花

C. 桑叶

D. 葛根

E. 升麻

227.能解肌退热，升阳止泻，治项背强痛与阳明头痛最宜，无论寒热虚实、有汗无汗皆可的药是(E)

A. 升麻

B. 柴胡

C. 菊花

D. 香薷

E. 葛根

228.浮萍除发汗解表，利水消肿外，还能(B)

A. 升阳止泻 8

B. 疏肝解郁

C. 理气宽中

D.透疹止痒

E.解肌退热

229.某男，50岁。感冒后伴见热郁胸中所致烦闷不眠，医师选用淡豆豉为其治疗。

此因淡豆豉的功效是(B)

A. 理气，升阳

C. 解毒，透疹

B.解表，除烦

D. 解表，宽中

E. 解郁，宁心

230.蝉蜕和木贼均能疏散风热，明目退翳。与蝉蜕相比，木贼具有的功效是(B)

A. 透疹

B.止血

C.止泻

D.止痒

E. 除烦

231.某女，29岁。因久坐少动而致腰膝酸痛，近日又因外感风寒而致感冒发热、少阴头痛。直选用的药是(D)

A. 秦皮

B. 威灵仙

C.络石藤

D. 独活

E. 乳香

232.威灵仙除祛风湿，通经络外，还能(A)

A. 消痰水，治骨鲠

B. 解表，除烦

C.止痛，利水

D.清热解毒，降血压

E.清虚热，利湿退黄

233.某男，51岁。素患风湿热痹，近日又见脚气浮肿，腹水。直选用的药是(A)

A. 防己

B. 威灵仙

C.青风藤

D. 秦艽

E. 香加皮

234. 伸筋草除祛风除湿，舒筋通络外，还能(B)

A. 清热解毒

B. 活血消肿

C. 利水消肿

D. 利湿退黄

E. 补益肝肾

235. 蕲蛇的功效是(A)

A. 祛风通络，定惊止痉

B. 燥湿化痰，息风止痉

C. 疏风散寒，祛风止痉

D. 祛风除湿，活血通络

E. 活血止痛，祛风散寒

236. 鹿衔草除祛风湿，强筋骨外，还能(B)

A. 清热燥湿，化痰解毒

B. 调经止血，补肺止咳

C. 活血止痛，凉血消肿

D. 利水渗湿，健脾止泻

E. 祛痰止咳，清肝明目

237. 某男，44岁。因常去水库钓鱼而致湿盛痿证、脚气，近日又患夜盲。宜选用的药是(E)

A. 香薷

B. 厚朴

C. 白豆蔻

D. 浮萍

E. 苍术

238. 厚朴不具有的功效是(D)

A. 燥湿

B. 行气

C. 消积

D. 止呕

E. 平喘

239.善治湿阻中焦、湿热困脾的药是(B)

A. 砂仁

B.佩兰

C.厚朴

D.香薷

E.白豆蔻

240.苍术不具有的功效是(E)

A. 祛风湿

B.发汗

C.燥湿健脾

D.明目

E. 利水消肿

241.某女，50岁。患寒湿中阻、疟疾，医师拟选用燥湿温中，除痰截疟之品。宜选用的药是(C)

A. 苍术

B.鸦胆子

C.草果

D. 草豆蔻

E. 广藿香

242.某女，33岁。妊娠4月，自觉脘腹胀满，呕吐泄泻，医师诊为妊娠恶阻。宜选用的药是(A)

A. 砂仁

B.桑寄生

C. 白米

D.续断

E.阿胶

243.某女，44岁。近日自觉脘腹胀满疼痛、呕吐、泄泻，医师诊为寒湿中阻。治当燥湿行气，温中止呕，宜选用的药是(B)

A. 广藿香

B. 草豆蔻

C.草果

D.生姜

E.紫苏

244.某男，76岁。患肾阳不足、命门火衰所致畏寒肢冷，又见脾肾阳虚所致脘腹冷痛、水肿，宜选用的药是 (E)

A. 吴茱萸

B.小茴香

C.高良姜

D.花椒

E.附子

245.干姜除温中，回阳外，还能(A)

A.温肺化饮

B.渗湿止泻

C.行气止呕

D.利水通淋

E.杀虫止痒

246.治疗心阳虚衰所致心悸、胸痹，阳虚外感,宜选用的药是(B)

A. 细辛

B.附子

C.肉桂

D.干姜

E. 五味子

247.肉桂不具有的功效是(B)

A.散寒止痛

B.回阳救逆

C.引火归元

D.补火助阳

E.温通经脉

248.荜茇除能温中散寒外，还能(E)

A.温肺化饮

B.疏肝降气

C.柔肝止痛

D.杀虫止痒

E.行气止痛

249.薄荷除宣散风热，清利头外，还能(B)

- A. 明目退翳
- B. 透疹，疏肝
- C. 通鼻窍
- D. 祛风止痛
- E.息风止痉

250.蔓荆子除疏散风热，清利头目外，还能(D)

- A. 明目退翳
- B. 透疹，疏肝
- C. 通鼻窍
- D. 祛风止痛
- E.息风止痉

251.柴胡除升举阳气外，还能(A)

- A. 解表退热，疏肝解郁
- B. 发表透疹，清热解毒
- C. 解表，除烦
- D.平肝明目，清热解毒
- E. 解肌退热，生津，透疹

252.升麻除升举阳气外，还能(B)

- A.解表退热，疏肝解郁
- B.发表透疹，清热解毒
- C. 解表，除烦
- D.平肝明目，清热解毒
- E. 解肌退热，生津，透疹

253.防风除祛风解表，止痛外，还能 (C)

- A. 透疹止痒，止血
- B. 发汗解肌，利水消肿
- C.胜湿，解痉
- D.温肺化饮，通窍
- E.燥湿止带，消肿排脓

254.细辛除祛风散寒，止痛外，还能 (D)

- A. 透疹止痒，止血
- B. 发汗解肌，利水消肿
- C. 胜湿，解痉
- D. 温肺化饮，通窍
- E. 燥湿止带，消肿排脓

255.善治阳明头痛，寒湿带下的是(D)

- A. 防风
- B. 干姜
- C. 细辛
- D. 白芷
- E. 羌活

256.善治太阳头痛，表证夹湿的是(E)

- B. 防风
- B. 干姜
- C. 细辛
- D. 白芷
- E. 羌活

257.善治少阴头痛，寒饮咳喘的是(C)

- C. 防风
- B. 干姜
- C. 细辛
- D. 白芷
- E. 羌活

258.豨莶草祛除风湿，通经络外，还能(D)

- A. 补肝肾，利水
- B. 补肝肾，安胎
- C. 清虚热，利湿退黄
- D. 清热解毒，降血压
- E. 舒筋通络，活血消肿

259.桑寄生祛除风湿，强筋骨外，还能(B)

- A. 补肝肾，利水
- B. 补肝肾，安胎

- C.清虚热，利湿退黄
- D.清热解毒，降血压
- E.舒筋通络，活血消肿

260.五加皮除祛风湿，强筋骨外，还能(A)

- A. 补肝肾，利水
- B.补肝肾，安胎
- C.清虚热，利湿退黄
- D.清热解毒，降血压
- E.舒筋通络，活血消肿

261.某女，61岁。患风湿热痹，关节肿痛，近日又见骨蒸潮热。宜选用的药是(D)

- A. 木瓜
- B. 香加皮
- C.五加皮
- D. 秦艽
- E.防己

262.某男，39岁。患风湿痹痛，脚气肿痛，近日又见湿浊中阻之吐泻转筋。宜选用的药是(A)

- A.木瓜
- B. 香加皮
- C.五加皮
- D. 秦艽
- E.防己

263.某男，72岁。患风寒湿痹，筋骨不利，近日又见心衰性水肿，小便不利。宜选用的药是(B)

- A.木瓜
- B.香加皮
- C.五加皮
- D.秦艽
- E.防己

264.路路通除祛风活络外，还能(B)

- A. 通气下乳，活血
- B.通经下乳，止痒

- C.凉血消肿
- D.活血散结，利咽
- E. 软坚，回乳

265.络石藤除祛风通络外，还能(C)

- A.通气下乳，活血
- B.通经下乳，止痒
- C.凉血消肿
- D.活血散结，利咽
- E. 软坚，回乳

266.川乌的功效是(C)

- A.祛风湿，通经络，利小便
- B.祛风通络，化痰解毒
- C.祛风除湿，散寒止痛
- D.祛风通络，通经下乳
- E.祛风通络，凉血消肿

267.青风藤的功效是(A)

- A.祛风湿，通经络，利小便
- B.祛风通络，化痰解毒
- C.祛风除湿，散寒止痛
- D.祛风通络，通经下乳
- E.祛风通络，凉血消肿

268.丝瓜络的功效是(B)

- A.祛风湿，通经络，利小便
- B.祛风通络，化痰解毒
- C.祛风除湿，散寒止痛
- D.祛风通络，通经下乳
- E.祛风通络，凉血消肿

269.某男，39岁。患风湿痹痛，筋脉拘挛，近日又患喉痹。宜选用的药是(A)

- A. 络石藤
- B.海风藤
- C.秦艽
- D.丝瓜络

E. 桑枝

270.某男，44岁。患风湿痹痛，筋脉拘挛，近日又见瘀血肿痛，跌打损伤。宜选用的药是(B)

B. 络石藤

B.海风藤

C.秦艽

D.丝瓜络

E. 桑枝

271.徐长卿除祛风止痛，活血通络外，还能(A)

A. 止痒，解蛇毒

B. 补肝肾，强筋骨

C.利尿消肿

D.凉血解毒，杀虫

E.消肿止痛，杀虫解毒

272.雷公藤除祛风除湿，活血通络外，还能(E)

A. 止痒，解蛇毒

B. 补肝肾，强筋骨

C.利尿消肿

D.凉血解毒，杀虫

E.消肿止痛，杀虫解毒

273.某男，47岁。患脚气浮肿，前日因给家搬仓库而致上肢疼痛，筋脉拘挛。宜选用的药是(A)

A. 桑枝

B. 路路通

C.威灵仙

D. 乌梢蛇

E. 香加皮

274.某男，37岁。产后患水肿，小便不利,又见乳房胀痛，乳汁不下。宜选用的药是(B)

A.桑枝

B. 路路通

C.威灵仙

D. 乌梢蛇

E. 香加皮

275.某女, 69 岁。患中风半身不遂, 肢体麻木近日又见顽癣, 皮肤瘙痒。宜选用的药是(D)

A.桑枝

B. 路路通

C.威灵仙

D. 乌梢蛇

E. 香加皮

276.广藿香除化湿外, 还能(B)

A.温中止泻, 行气

B.发表解暑, 止呕

C.燥湿健脾, 明目

D.行气消积, 平喘

E. 祛风湿, 止泻

277.砂仁除化湿外,还能(A)

A.温中止泻, 行气

B.发表解暑, 止呕

C.燥湿健脾, 明目

D.行气消积, 平喘

E. 祛风湿, 止泻

278.肉桂的主治是 (C)

A.虫积腹痛, 蛔虫、蛲虫病

B.睾丸偏坠胀痛, 龋齿牙痛

C.下元虚冷、虚阳上浮所致上热下寒证

D.中寒肝逆所致头痛、吐涎沫

E.寒凝气滞所致脘腹胀痛

279.吴茱萸的主治是(D)

A.虫积腹痛, 蛔虫、蛲虫病

B.睾丸偏坠胀痛, 龋齿牙痛

C.下元虚冷、虚阳上浮所致上热下寒证

D.中寒肝逆所致头痛、吐涎沫

E.寒凝气滞所致脘腹胀痛

280.既治中寒呕吐、泄泻，又治虫积腹痛的是(A)

- A. 花椒
- B.小茴香
- C.丁香
- D.吴茱萸
- E. 高良姜

281.既治中寒呕吐、呃逆，又治肾阳虚所致阳痿、宫冷的是(C)

- A. 花椒
- B.小茴香
- C.丁香
- D.吴茱萸
- E. 高良姜

282.某女，3岁。因在小区玩耍时被流浪狗追赶而受到惊吓，现已惊哭夜啼2日，伴音哑咽痛，根据患者症状，宜选用的药是(A)

- A. 蝉蜕
- B. 木贼
- C.薄荷
- D. 牛蒡子
- E. 灯心草

283. 蝉蜕的功效是(C)

- A.明目退翳，止血
- B. 清利头目，利咽
- C.透疹止痒，息风止痉
- D.宣肺利咽，消肿疗疮
- E.清心除烦，利尿消肿

284.医师治疗风热感冒、肝阳眩晕、目赤肿痛常选桑叶配菊花，桑叶和菊花共同的功效是(C)

- A.清肺润燥，平肝明目
- B.疏散风热，清热解毒
- C.疏散风热，平肝明目
- D.平肝明目，清热解毒

E.清肺润燥，凉血止血

285.桑叶能(E)

A. 宣肺平喘，利水消肿

B. 宣肺利咽，解毒透疹

C.清肺润燥，清热解毒

D.凉血止血，清热解毒

E.清肺润燥，凉血止血

286.知母除清热泻火外，还能(C)

A.养阴补血

B.泻肝胆火

C.滋阴润燥

D.清心除烦

E.燥湿止带

287.善治胃热呕吐、热淋涩痛的药是 (D)

A. 栀子

B.竹叶

C.天花粉

D. 芦根

E.苎麻根

288.能清肝泻火，明目退翳，为治目疾之要药,兼降血压的是(D)

A. 谷精草

B.夏枯草

C.决明子

D. 青箱子

E.密蒙花

289.某女，33岁。患肺热咳嗽，燥咳痰黏，咳痰带血,近日又因骑电动车时与他人相撞而致跌打肿痛。治当清肺润燥，消肿排脓，宜选用的药是(E)

A. 石膏

B.桑叶

C.栀子

D.芦根

E. 天花粉

290.竹叶能凉散上焦风热，治风热表证及温病初期常用。其功效为(C)

- A.清热生津，除烦止呕，利尿
- B.泻火除烦，清热利尿，凉血解毒
- C.清热除烦，生津，利尿
- D.清热泻火，除烦止渴，生肌止血
- E.清肺润燥，消肿排脓

291.某女，43岁。患水肿、黄疸。近日又见心火上炎且移热于小肠所致口疮、尿赤。宜选用的药是(D)

- A.夏枯草
- B.石膏
- C.芦根
- D.淡竹叶
- E.竹叶

292.能泻下，软坚，为治实热内结、燥屎坚硬难下之要药的是(D)

- A.大黄
- B.芦荟
- C.番泻叶
- D.芒硝
- E.火麻仁

293.某男，9岁。患热结便秘，近日又因接触流浪猫狗而致瘰疮。治当泻下，杀虫，宜选用的药是(B)

- A.大黄
- B.芦荟
- C.番泻叶
- D.巴豆
- E.郁李仁

294.番泻叶除泻热通便外，还能(E)

- A.祛痰止咳
- B.清肝杀虫
- C.泻下软坚
- D.生津止渴
- E.消积健胃

- 295.某女, 40 岁。产后瘀阻腹痛、大便秘结, 又因火热上攻导致目赤、牙龈肿痛。宜选用的(D)**
- A. 芦荟
 - B. 龙胆
 - C. 芒硝
 - B. 大黄
 - E. 千金子
- 296.某男, 49 岁。患肠燥便秘, 脚气浮肿。宜选用的药是(C)**
- A. 巴豆
 - B. 火麻仁
 - C. 郁李仁
 - D. 芫花
 - E. 甘遂
- 297.火麻仁除润肠通便外, 还能(A)**
- A. 补虚
 - B. 利水
 - C. 凉血
 - D. 杀虫
 - E. 行气
- 298.医师治疗水肿, 鼓胀, 闭经, 瘀痕常选用千金子, 此因其功效是)E)**
- A. 泻下冷积, 逐水退肿
 - B. 泻水逐饮, 祛痰止咳
 - C. 泻水逐饮, 消肿散结
 - D. 润肠通便, 利水消肿
 - E. 泻水逐饮, 破血消癥
- 299.治疗大腹水肿, 身面浮肿, 胸肋停饮, 痈肿疮毒, 瘰疬痰核, 宜选用的药是(C)**
- A. 巴豆
 - B. 郁李仁
 - C. 京大戟
 - D. 火麻仁
 - E. 芦荟
- 300.某男, 40 岁。患寒积便秘, 腹满胀痛, 近日又见喉痹痰阻。宜选用的药是(D)**

- A. 芫花
- B. 牵牛子
- C. 大黄
- D. 巴豆
- E. 千金子

301. 外表常有木栓层，横切面有放射状结构，木部尤为明显，中央有明显的髓部，形成层环明显的是（ B ）。

- A. 双子叶植物的根
- B. 双子叶植物的根茎
- C. 单子叶植物的根
- D. 单子叶植物的根茎
- E. 蕨类植物的根茎

302. 呈不规则的长块状，表面深棕色，残留金黄色绒毛，质坚硬，不易折断。无臭，味淡、微涩的药材是（ A ）。

- A. 狗脊
- B. 绵马贯众
- C. 细辛
- D. 大黄
- E. 虎杖

303. 来源为鳞毛蕨科植物干燥根茎和叶柄残基的药材是（ B ）。

- A. 狗脊
- B. 绵马贯众
- C. 大黄
- D. 虎杖
- E. 何首乌

304. 细辛的气味是（ E ）。

- A. 气辛香，味苦、刺舌
- B. 气香特异，味苦、麻舌
- C. 气辛香，味辛辣、刺舌
- D. 气香特异，味淡
- E. 气辛香，味辛辣、麻舌

305. 根木部发达，具放射状纹理，形成层环明显，无“星点”。气清香，味苦而微涩，嚼之粘牙，有沙粒感。粉末显微鉴别可见草酸钙簇晶大而多的药材是（ C ）。

- A. 何首乌
- B. 虎杖
- C. 大黄
- D. 商陆
- E. 川牛膝

306. 虎杖的原植物来源于（ B ）。

- A. 豆科
- B. 蓼科
- C. 苋科
- D. 石竹科
- E. 虎杖科

307. 呈团块状或不规则纺锤形，切断面浅黄棕色或浅红棕色，显粉性，皮部有4-11个类圆形异型维管束环列。气微，味微苦而甘涩的药材是（A）。

- A. 何首乌
- B. 牛膝
- C. 川牛膝
- D. 川乌
- E. 大黄

308. 呈圆柱形的段，切面平坦，淡棕色或棕色，略呈角质样而油润，中心维管束木质部较大，黄白色，其外围散有多数黄白色点状异型维管束，断续排列成2-4轮的饮片是（B）。

- A. 何首乌
- B. 牛膝
- C. 川牛膝
- D. 木通
- E. 胡黄连

309. 呈近圆柱形，微扭曲，断面浅黄色或棕黄色，异型维管束点状，排列成数轮同心环。气微，味甜的药材是（D）。

- A. 银柴胡
- B. 胡黄连
- C. 牛膝
- D. 川牛膝
- E. 甘草

310. 断面平坦，灰白色，富粉性，有排列较稀疏的放射状纹理的药材是（B）

- A. 豆根
- B. 防己
- C. 升麻
- D. 粉葛
- E. 白术

311. 表面浅棕黄色至浅棕色，多具孔穴状或盘状凹陷，习称“砂眼”。根头部略膨大，有密集的呈疣状突起的芽苞、茎或根茎的残基。习称“珍珠盘”的药材是（C）。

- A. 柴胡
- B. 狭叶柴胡
- C. 银柴胡
- D. 党参
- E. 防风

312. 太子参的来源是（D）。

- A. 伞形科植物的根
- B. 石竹科植物的根
- C. 五加科植物的块根
- D. 石竹科植物的块根
- E. 五加科植物的根

313. 不规则扁球型，表面有不规则网状皱纹，断面黄色，角质样，有蜡样光泽的药材是（C）。

- A. 半夏
- B. 天南星
- C. 延胡索
- D. 白及
- E. 青北

314. 主产于四川，断面类白色或浅灰黄色，形成层环纹呈多角形。气微，味辛辣、麻舌的药材是（ B ）。

- A. 川牛膝
- B. 川乌
- C. 川黄柏
- D. 川续断
- E. 川芎

315. 附子的来源是（ E ）。

- A. 乌头的母根
- B. 北乌头的母根
- C. 北乌头的母根的加工品
- D. 乌头的子根
- E. 乌头的子根的加工品

316. 表面类白色或淡红棕色。断面较平坦，类白色或略带棕红色，形成层环明显，射线放射状。粉末显微鉴别可见纤维长梭形，壁厚，微木化，具大的圆形纹孔的药材（ C ）。

- A. 甘草
- B. 黄芪
- 白芍
- D. 赤芍
- E. 天花粉

317. 根茎簇生多数细根，多编成辫状药材是（ B ）。

- A. 白薇
- B. 紫菀
- C. 茜草
- D. 紫草
- E. 香附

318. 多分枝，形如鸡爪，断面不整齐，皮部橙红色或暗棕色，木部鲜黄色或橙黄色，呈放射状排列，髓部有的中空。粉末显微鉴别可见鳞叶表皮细胞长方形或长三角形，壁微波状弯曲或作连珠状增厚的药材是（ A ）。

- A. 味连
- B. 板蓝根
- C. 藁本
- D. 防风
- E. 云连

319. 多分枝，呈结节状，表面黑褐色或棕褐色，有坚硬的细须根残留，上面有数个圆形空洞的茎基痕，洞内壁显网状沟纹的药材是（ B ）。

- A. 黄连
- B. 升麻
- C. 北豆根
- D. 藁本

E. 紫草

320. 防己的原植物是（ C ）。

A. 汉防己

B. 广防己

C. 粉防己

D. 木防己

E. 川防己

321. 呈细长圆柱形，表面黄棕色至暗棕色，质韧，断面不整齐，纤维细，木部淡黄色，呈放射状排列，中心有髓。气微，味苦的药材是（ B ）。

A. 山豆根

B. 北豆根

C. 葛根

D. 板蓝根

E. 苦参

322. 延胡索来源于（ E ）。

A. 防己科

B. 豆科

C. 十字花科

D. 伞形科

E. 罂粟科

323. 根头略膨大，可见暗绿色或暗棕色轮状排列的叶柄残基和密集的疣状突起。气微，味微甜后苦涩的药材是（ C ）。

A. 防风

B. 羌活

C. 板蓝根

D. 党参

E. 银柴胡

324. 表面灰褐色至暗棕色，具纵皱纹，粗糙。质硬，折断面较平坦，略显粉质，皮部淡黄色，木部粉红色或淡黄色，有放射状纹理。气微，味微苦而涩的药材是（ E ）。

A. 白芍

B. 赤芍

C. 防己

D. 山药

E. 地榆

325. 呈长圆柱形，表面灰棕色或棕黄色，具纵皱纹及横长皮孔样突起，外皮薄，多破裂反卷，易剥落，剥落处显黄色。气微，味极苦的药材是（ D ）。

A. 山豆根

B. 葛根

C. 甘草

D. 苦参

E. 黄芪

326. 根茎呈不规则的结节状，顶端常残存茎基，其下着生根数条。根呈长圆柱形，常有分枝，表面棕色至棕褐色，有不规则的纵皱纹及横长皮孔样突起。质坚硬，难折断，断面皮部浅棕色，木部淡黄色。有豆腥气，味极苦的药材是（ B ）。

- A. 胡黄连
- B. 山豆根
- C. 前胡
- D. 龙胆
- E. 北沙参

327. 粉葛来源于（ D ）。

- A. 木通科
- B. 蔷薇科
- C. 木犀科
- D. 豆科
- E. 藜科

328. 取本品投入热水，水染成鲜艳桃红色，加碱变成黄色，再加碱液，变成红色的药材是（ D ）。

- A. 石斛
- B. 降香
- C. 沉香
- D. 苏木
- E. 通草

329. 呈圆柱形，略弯曲，表面有较密并深陷的横皱纹、纵皱纹及裂纹，老根的横皱纹更密更深陷，略呈结节状。断面皮部棕黄色，抽去木心者中空，未去净者木部黄白色，皮部易与木部剥离。气微，味苦、微辛，嚼之有刺喉感的药材是（ B ）。

- A. 巴戟天
- B. 远志
- C. 石菖蒲
- D. 防己
- E. 北沙参

330. 播种在山林野生状态下自然生长的人参，习称（ B ）。

- A. 园参
- B. 籽海
- C. 活性参
- D. 芋
- E. 红参

331. 红参的断面呈（ C ）。

- A. 空洞状
- B. 纤维性
- C. 角质样
- D. 刺状
- E. 粉性

332. 三七的根茎习称（ C ）。

- A. 三七
- B. 筋条
- C. 剪口
- D. 绒根

E. 芦头

333. 水浸出液日光下显碧蓝色荧光的药材是 (D)。

- A. 合欢皮
- B. 牡丹皮
- C. 肉桂
- D. 秦皮
- E. 地骨皮

334. 采收加工时, 需要捆成小把, 上棚, 以烟火慢慢熏干的药材是 (B)。

- A. 川芎
- B. 当归
- C. 苍术
- D. 羌活
- E. 白芷

335. 表面棕褐色至黑褐色, 外皮脱落处呈黄色。节间缩短, 呈紧密隆起的环状, 形似蚕的药材是 (D)。

- A. 僵蚕
- B. 冬虫夏草
- C. 当归
- D. 羌活
- E. 防风

336. 横切片切面黄白色或灰黄色, 散有黄棕色小油点, 可见明显波状环纹或多角形纹理。纵切片边缘不整齐, 呈蝴蝶状的饮片是 (E)。

- A. 防风
- B. 北沙参
- C. 当归
- D. 延胡索
- E. 川芎

337. 表面棕褐色或暗棕色, 粗糙, 有纵皱纹, 上侧残留数个凹陷的圆形茎基, 下侧有多数点状突起的根痕及残根。体轻, 质较硬, 易折断, 断面黄色或黄白色, 纤维状。气浓香, 味辛、苦、微麻的药材是 (B)。

- A. 细辛
- B. 藁本
- C. 羌活
- D. 防风
- E. 柴胡

338. 叶细小鳞片状, 交互对生, 贴伏于枝上, 深绿色或黄绿色的药材是 (A)。

- A. 侧柏叶
- B. 罗布麻叶
- C. 紫苏叶
- D. 艾叶
- E. 番泻叶

339. 表面红棕色或黑棕色, 靠近根头处多具细密环纹。质稍软, 易折断, 断面略平坦, 不显纤维性。具败油气的药材是 (C)。

- A. 北沙参
- B. 南沙参

- C. 南柴胡
D. 北柴胡
E. 关防风

340. 呈细长圆柱形，表面淡黄白色，略粗糙，偶有残存外皮。质脆，易折断，断面皮部浅黄白色，木部黄色。气特异，味微甘的药材是（ C ）。

- A. 桔梗
B. 南沙参
C. 北沙参
D. 徐长卿
E. 北沙参

341. 龙胆是几基原的中药？（ D ）。

- A. 一基原
B. 二基原
C. 三基原
D. 四基原
E. 五基原

342. 外表皮黄棕色、灰黄色或棕褐色，粗糙，有扭曲纵纹或网状孔纹。切面皮部黄色或棕黄色，木部黄色，有的中心呈枯朽状。气特异，味苦、微涩的饮片是（ A ）。

- A. 秦艽
B. 黄芪
C. 黄芩
D. 升麻
E. 龙胆

343. 表面淡黄白色至淡棕黄色或棕色；具微细的纵皱纹，并有纤细的须根。质脆，易折断，断面粉性，切断面皮部类白色或黄白色，形成层环淡棕色，木部细小。气香，味微辛凉的药材是（ C ）。

- A. 白前
B. 柴胡
C. 徐长卿
D. 白薇
E. 茜草

344. 邹缩而卷曲，花瓣多散落。完整者花萼钟状，黄绿色，先端 5 浅裂的药材（ C ）。

- A. 红花
B. 西红花
C. 槐花
D. 洋金花
E. 菊花

345. 白薇来源于（ B ）。

- A. 蔷薇科
B. 萝藦科
C. 茜草科
D. 伞形科
E. 唇形科

346. 来源于旋花科的中药是（ C ）。

- A. 葶苈子
B. 地肤子
C. 牵牛子
D. 蛇床子
E. 女贞子

347. 外表皮棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。切面有裂隙或略平整而致密，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，有黄白色放射状纹理。气微，味微苦涩的饮片是（ D ）。

- A. 郁金
B. 川芎
C. 当归
D. 丹参
E. 玄参

348. 黄芩的采收加工需要（ E ）。

- A. 洗去粗皮
B. 刮去粗皮
C. 浸去粗皮
D. 切去粗皮
E. 撞去粗皮

349. 种子水浸后，种皮呈龟裂状的药材是（ C ）。

- A. 沙苑子
B. 决明子
C. 牵牛子
D. 菟丝子
E. 马钱子

350. 表面浅红黄色，具弯曲的纵皱纹、芽痕、横长皮孔样突起以及不规则疤痕。肉质、易断，断面皮部淡黄白色，可见橘红色油点，木部黄白色，导管呈放射状排列。气微，味微甜、微苦的药材是（ A ）。

- A. 鲜地黄
B. 生地黄
C. 玄参
D. 党参
E. 熟地黄

351. 表面灰棕色至暗棕色，粗糙，有较密的环状节，断面略平坦，淡棕色至暗棕色，木部有 4-10 个类白色点状维管束排列成环。气微，味极苦的药材是（ C ）。

- A. 银柴胡
B. 白薇
C. 胡黄连
D. 牛膝
E. 川牛膝

352. 多卷曲成团状，全体密被白色绒毛，绵软如绒；气清香，味微的药材是（ A ）。

- A. 茵陈
B. 广藿香
C. 香薷
D. 金钱草
E. 淡竹叶

353. 根茎呈结节状。根呈圆柱形略弯曲或扭曲，表面红棕色或暗棕色，具细纵皱纹及少数细根痕；皮部易剥落，露出黄红色木部。气微，味微苦，久嚼刺舌的药材是（ C ）。

- A. 远志
- B. 巴戟天
- C. 茜草
- D. 紫草
- E. 丹参

354. 呈长圆柱形，略扁，表面灰褐色或黄褐色，有稍扭曲或明显扭曲的纵皱及沟纹，可见横裂的皮孔样斑痕及少数须根痕。断面不平坦，皮部墨绿色或棕色，横切面外缘褐色或淡褐色。木部黄褐色，导管束呈放射状排列。气微香，味苦、微甜而后涩的药材（ B ）。

- A. 防风
- B. 续断
- C. 桔梗
- D. 木香
- E. 紫菀

355. 为类圆形、半圆形或不规则形厚片。外表皮黄白色或淡棕黄色。切面可见黄色木质部小孔，略呈放射状排列。气微，味微苦的饮片是（ C ）。

- A. 白芷
- B. 山药
- C. 天花粉
- D. 泽泻
- E. 葛根

356. 呈椭圆形或不规则厚片，外皮多已除去或偶有残留。切面皮部黄白色，较窄；形成层环纹明显，棕色；木部宽，有较多裂隙。气微，味微甜后苦的饮片是（ E ）。

- A. 甘草
- B. 黄芪
- C. 苦参
- D. 板蓝根
- E. 桔梗

357. 党参来源于（ B ）。

- A. 五加科植物的根
- B. 桔梗科植物的根
- C. 唇形科植物的根
- D. 葫芦科植物的根
- E. 百合科植物的根

358. 南沙参药材的质地特征是（ D ）。

- A. 体轻，质硬脆，易折断
- B. 体重，质柔韧，不易折断
- C. 体重，质坚实，不易折断
- D. 体轻，质松泡，易折断
- E. 体轻，质松泡，不易折断

359. 下列以干燥子实体入药的药材是（ C ）。

- A. 茯苓
- C. 灵芝
- E. 雷丸

- B. 猪苓
- D. 冬虫夏草

360. 呈不规则的肥厚团块。质坚硬，不易折断，断面不平坦，黄白色至淡棕色，有棕黄色的点状油室散在。粉末显微鉴别可见草酸钙针晶细小，纤维长梭形的药材是（ D ）。

- A. 大黄
- C. 苍术
- E. 川芎

- B. 木香
- D. 白术

361. 呈不规则连珠状或结节状圆柱形。质坚实，断面黄白色或灰白色，散有少数棕红色或橙黄色油点（油室），暴露稍久，可析出白色细针状结晶。气香特异，味微甘、辛、苦的药材是（ A ）。

- A. 苍术
- C. 木香
- E. 当归

- B. 白术
- D. 川芎

362. 根茎簇生多数细根，多编成辫状；表面紫红色或灰红色，有纵皱纹。气微香，味甜、微苦的药材是（ E ）。

- A. 细辛
- C. 龙胆
- E. 紫菀

- B. 威灵仙
- D. 秦艽

363. 三棱的气味是（ A ）。

- A. 气微，味淡，嚼之微有麻辣感
- C. 气微，味辛辣、麻舌而刺喉
- E. 气微腥，味初甜而后有持久的麻辣感

- B. 气辛香，味辛辣、麻舌
- D. 气微，味苦、微辛，刺喉

364. 表面淡黄色至淡黄棕色，有不规则的横向环状浅沟纹和多数细小突起的须根痕。质坚实，断面黄白色，粉性，有少数细孔的药材是（ C ）。

- A. 三棱
- C. 泽泻
- E. 天南星

- B. 莪术
- D. 半夏

365. 多呈纺锤形，表面棕褐色或黑褐色，有纵皱纹，并有 6-10 个略隆起的环节，节上有未除净的棕色毛须及须根断痕。气香，味微苦的药材是（ C ）。

- A. 狗脊

- B. 川乌

C. 香附

D. 绵马贯众

E. 白芍

366. 表面类白色或淡棕色，较光滑，顶端有凹陷的茎痕，周围有麻点状根痕，有的块茎周边具小扁球状侧芽。质坚硬，不易破碎，断面不平坦，色白，粉性。气微辛，味麻辣的药材（ B ）。

A. 延胡索

B. 天南星

C. 半夏

D. 川贝母

E. 浙贝母

367. 呈类球形。表面棕色至棕褐色。质硬脆，断面淡黄棕色，常具角质样光泽。气微香，味淡，微有麻舌感，嚼之略粘牙的饮片是（ D ）。

A. 生半夏

B. 法半夏

C. 清半夏

D. 姜半夏

E. 半夏曲

368. 呈不规则的块状和脂膏状，具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼烧感的药材是（ D ）。

A. 乳香

B. 没药

C. 血竭

D. 阿魏

E. 苏合香

369. 呈不规则的条形斜片。表面灰白色、棕黄色，有深纵皱纹。切面灰白色、淡黄棕色或黄白色，角质样；皮部较厚，中柱扁缩。质韧软的饮片是（ C ）。

A. 麦冬

B. 天冬

C. 百部

D. 红参

E. 黄芪

370. 呈长圆锥形，高 0.7-2.5cm，直径 0.5-2.5cm，表面类白色或浅棕黄色。外层鳞叶 2 瓣，大小相近，相对抱合，顶端开裂而略尖。粉末显微鉴别可见淀粉粒广卵形，脐点人字状，层纹明显的药材是（ C ）。

A. 松贝

B. 青贝

C. 炉贝

D. 大贝

E. 珠贝

371. 呈不规则的厚片。外表皮淡黄色至黄棕色，切面略呈角质样，可见多数淡黄色小筋脉点。质稍硬而韧。气微，味甜，嚼之有黏性的饮片是（ A ）。

A. 黄精

B. 玄参

- C. 生地黄
D. 熟地黄
E. 大黄

372. 外表皮黄白色至淡黄棕色，半透明，有时可见环节，切面角质样或显颗粒性，能够治疗阴虚外感的饮片是（ B ）。

- A. 白薇
B. 玉竹
C. 竹菇
D. 银柴胡
E. 胡黄连

373. 呈结节状扁圆柱形，表面黄棕色，外皮脱落处呈白色；密具层状突起的粗环纹，一面结节明显，结节上具椭圆形凹陷茎痕，另一面有疏生的须根。顶端具鳞叶和茎的残基。质坚实，断面平坦，白色至浅棕色，粉性的药材是（ D ）。

- A. 黄精
B. 三棱
C. 续断
D. 重楼
E. 三七

374. 表面黄棕色或灰褐色，凹凸不平，有坚硬的须根残基，分枝顶端有圆形芽痕，有的外皮现不规则裂纹，并有残留的鳞叶。切面可见点状维管束及多数小亮点；质略韧，折断时有粉尘飞扬，以水湿润后有黏滑感的药材是（ E ）。

- A. 山药
B. 泽泻
C. 玉竹
D. 知母
E. 土茯苓

375. 天冬的采收加工需要（ A ）。

- A. 沸水中煮或蒸至透心
B. 置沸水中略烫
C. 煮至恰无白心
D. 蒸软
E. 九蒸九晒

376. 点燃时发生浓烟，并有带光的火焰的药材是（ B ）。

- A. 海金沙
B. 冰片
C. 降香
D. 血竭
E. 青黛

377. 呈不规则类圆形的厚片。外表皮黄棕色或棕色，可见少量残存的黄棕色叶基纤维或凹陷或突起的点状根痕。切面黄白色至黄色。气微，味微甜、略苦，嚼之带黏性的饮片是（ B ）。

- A. 山药
B. 知母
C. 麦冬
D. 天冬

E. 白及

378. 下列药材中，具有“方胜纹”特征的是（ A ）。

A. 蕲蛇

B. 鹿茸

C. 蛤蚧

D. 麝香

E. 桑螵蛸

379. 呈不规则形或长条形的薄片外表皮黄褐色、棕褐色或黑褐色，皱缩，可见残留的须根和须根痕。切面鲜黄色，具散在小筋脉点的饮片是（ E ）。

A. 黄芩

B. 三棱

C. 石菖蒲

D. 知母

E. 射干

380. 呈类圆形厚片。外表皮灰黄色或灰棕色，有时可见须根痕，切面黄绿色，内皮层环纹明显，散在“筋脉”小点。气微香，味微苦而辛的饮片是（ B ）。

A. 三棱

B. 莪术

C. 射干

D. 郁金

E. 姜黄

381. 雄黄的主要成分是（ C ）。

A. 二硫化铁

B. 含水硅酸镁

C. 二硫化二砷

D. 含水硫酸钠

E. 硫化汞

382. 郁金是几基原的中药？（ D ）。

A. 一基原

B. 二基原

C. 三基原

D. 四基原

E. 五基原

383. 表面黄白色至淡黄棕色，有纵皱纹及由点状突起（潜伏芽）轮。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽苞或残留茎基；底部有圆脐形疤痕的药材是（ C ）。

A. 重楼

B. 黄芪

C. 天麻

D. 郁金

E. 延胡索

384. 呈圆柱形，表面黄褐色或棕褐色，具纵皱纹，外皮脱落处可见丝瓜络状细筋脉；根头偶有黑色发黏的胶状物，断面黄白色或黄色，有深黄色稀疏油点及裂隙。气微香，味苦，嚼之粘牙的药材是（ D ）。

A. 续断

B. 南柴胡

- C. 木香
D. 川木香
E. 胡黄连

385.生物碱多存在于 (B)。

- A. 单子叶植物
B. 双子叶植物
C. 蕨类植物
D. 裸子植物
E. 藻类植物

386.在植物体内大多数生物碱的存在形式是 (D)。

- A. 游离状态
B. 无机酸盐
C. 络合物
D. 有机酸盐
E. 内盐状态

387.属于异喹啉类生物碱的是 (C)。

- A. 槟榔碱
B. 古柯碱
C. 罂粟碱
D. 长春碱
E. 长春新碱

388.含吡咯里西啶类生物碱,且有肝、肾毒性的中药是 (D)。

- A. 防己
B. 延胡索
C. 何首乌
D. 千里光
E. 王不留行

389.主要化学成分为苦参碱和氧化苦参碱的中药是 (E)。

- A. 黄连
B. 防己
C. 马钱子
D. 天仙子
E. 山豆根

390.附子的主要毒性成分是 (A)。

- A. 双酯型生物碱
B. 单酯型生物碱
C. 季铵型生物碱
D. 醇胺型生物碱
E. 有机胺型生物碱

391.《中国药典》规定,以土的宁为指标成分之一的中药是 (C)。

- A. 苦参
B. 麻黄
C. 马钱子
D. 连翘
E. 地骨皮

392.洋金花所含生物碱主要有 (A)。

- A. 东莨菪碱
B. 汉防己甲素

- C. 乌头碱
D. 巴马汀
E. 药根碱

393. 麻黄中生物碱的主要类型是 (B) 。

- A. 双稠哌啶类
B. 有机胺类
C. 异喹啉类
D. 莨菪烷类
E. 吲哚类

394. 具有典型的肝肠循环特点的药物是 (E) 。

- A. 苦参碱
B. 土的宁
C. 槟榔次碱
D. 雷公藤次碱
E. 异汉防己甲素

395. 《中国药典》规定川乌药材中含有的乌头碱、次乌头碱和新乌头碱的总量为 (B) 。

- A. 0.035%-0.22%
B. 0.050%-0.17%
C. 0.010%-0.045%
D. 0.060%-0.12%
E. 0.20%-0.25%

396. 《中国药典》规定马钱子中土的宁含量为 (C) 。

- A. 0.08%-0.10%
B. 0.10%-0.18%
C. 1.20%-2.20%
D. 0.22%-2.25%
E. 1.80%-2.50%

397 关于生物碱在动、植物界的分布和存在的叙述, 错误的是 (E) 。

- A. 生物碱绝大多数存在于双子叶植物中
B. 藻类、水生类植物中未发现生物碱
C. 麻黄所含生物碱在麻黄髓部含量高
D. 三颗针所含生物碱主要集中在根部
E. 绝大多数生物碱是以无机酸盐形式存在

398. 吴茱萸中的吴茱萸碱属于 (B) 。

- 简单吲哚类生物碱
B. 色氨吲哚类生物碱
C. 单萜吲哚类生物碱
D. 双吲哚类生物碱
E. 吲哚喹啉类生物碱

399. 钩藤碱的碱性强于异钩藤碱是由于 (B) 。

- A. 杂化方式的影响
B. 氢键效应的影响
C. 诱导效应的影响
D. 共轭效应的影响

E. 空间效应的影响

400. 《中国药典》以苦参碱和氧化苦参碱为指标成分进行鉴别和含量测定的药材是 (E)。

- A. 麻黄
- B. 黄芩
- C. 葛根
- D. 槐米
- E. 山豆根

401. 山豆根中生物碱的主要类型是 (D)。

- A. 吲哚类
- B. 异喹啉类
- C. 莨菪烷类
- D. 喹诺里西啶类
- E. 有机胺类

402. 麻黄中的生物碱类型主要为 (A)。

- A. 有机胺类生物碱
- B. 芳香胺类生物碱
- C. 喹诺里西啶类生物碱
- D. 喹啉类生物碱
- E. 色氨吲哚类生物碱

403. 黄连有效成分中含量最高的是 (E)。

- A. 巴马汀
- B. 黄连碱
- C. 药根碱
- D. 木兰碱
- E. 小檗碱

404. 黄连中所含主要生物碱的类型是 (C)。

- A. 吡啶类生物碱
- B. 莨菪烷类生物碱
- C. 异喹啉类生物碱
- D. 吲哚类生物碱
- E. 有机胺类生物碱

405. 延胡索中所含主要生物碱的类型是 (D)。

- A. 单萜吲哚类生物碱
- B. 有机胺类生物碱
- C. 色氨吲哚类生物碱
- D. 异喹啉生物碱
- E. 喹诺里西啶类生物碱

406. 《中国药典》中延胡索的含量测定指标成分为 (B)。

- A. 延胡索甲素
- B. 延胡索乙素
- C. 巴马汀
- D. 去氢延胡索甲素
- E. 原小檗碱

407. 川乌的主要毒性成分是 (A)。

- A. 双酯型生物碱
- B. 单酯型生物碱

- C. 季铵型生物碱
D. 醇胺型生物碱
E. 有机胺型生物碱

408. 乌头及附子经水浸、加热等炮制后毒性变小的化学原理是毒性成分双酯型生物碱转变成几乎无毒性的 (C)。

- A. 单酯型生物碱
B. 醛型生物碱
C. 醇胺型生物碱
D. 酮型生物碱
E. 季胺型生物碱

409. 洋金花中生物碱的有效成分类型为 (C)。

- A. 单萜吲哚类生物碱
B. 有机胺类生物碱
C. 莨菪烷类生物碱
D. 异喹啉生物碱
E. 喹诺里西啶类生物碱

410. 《中国药典》中洋金花的含量测定指标成分为 (D)。

- A. 莨菪碱
B. 阿托品
C. 山莨菪碱
D. 东莨菪碱
E. 樟柳碱

411. 马钱子中所含的生物碱是 (E)。

- A. 樟柳碱
B. 巴马汀
C. 乌头碱
D. 秋水仙碱
E. 土的宁

412. 土的宁为马钱子的主要毒性成分，要特别注意控制其用量。成人用土的宁的致死量是 (B)。

- A. 35mg
B. 30mg
C. 25mg
D. 20mg
E. 15mg

413. 可用于鉴别土的宁与马钱子碱的反应是 (D)。

- A. 在酸水中通入氯气，溶液变为樱红色
B. Vitali 反应呈阳性
C. 过碘酸氧化，乙酰丙酮缩合反应呈阳性
D. 加浓硝酸即呈深红色，继加氯化亚锡溶液即由红色转为紫色
E. 加 $\text{CuSO}_4\text{-NaOH}$ 试剂呈蓝紫色

414. 千里光中所含的生物碱主要类型是 (A)。

- A. 吡咯里西啶类
B. 莨菪烷类
C. 苜基异喹啉类
D. 单萜吲哚类

E. 有机胺类

415. 《中国药典》中要求检查阿多尼弗林碱含量的中药是 (A)。

A. 千里光

B. 黄柏

C. 葛根

D. 山豆根

E. 虎杖

416. 雷公藤的主要毒性为 (A)。

A. 生殖毒性

B. 肝毒性

C. 肾毒性

D. 心脏毒性

E. 局部刺激反应

417. 按苷键原子分类, 氰苷属于 (A)。

A. 氧苷

B. 碳苷

C. 硫苷

D. 氮苷

E. 酚苷

418. 结构类型属于氧苷的是 (C)。

A. 芦荟苷

B. 萝卜苷

C. 红景天苷

D. 巴豆苷

E. 黑芥子苷

419. 羟基茜草素属于 (C)。

A. 香豆素

B. 萘醌

C. 蒽醌

D. 菲醌

E. 木脂素

420. 药材前胡中含有白花前胡甲素, 其结构类型为 (C)。

A. 生物碱

B. 黄酮

C. 香豆素

D. 呋喃香豆素

E. 蒽醌

421. 葛根素的结构类型为 (B)。

A. 生物碱

B. 黄酮

C. 蒽醌

D. 三萜皂苷

E. 有机酸

422. 薄荷醇的结构类型为 (A)。

A. 单萜

B. 倍半萜

C. 二萜

D. 二倍半萜

E. 三萜

423. 莪术醇的结构类型为 (B) 。

A. 单萜

B. 倍半萜

C. 二萜

D. 二倍半萜

E. 三萜

424. 不属于皂苷的理化性质的是 (E) 。

A. 刺激性

B. 吸湿性

C. 发泡性

D. 溶血性

E. 与蛋白质生成沉淀

425. 含可水解鞣质的中药是 (A) 。

A. 五倍子

B. 儿茶

C. 丹参

D. 麝香

E. 牛黄

426. 落果期采收的中药是 (E) 。

A. 牡丹皮

B. 木瓜

C. 山茱萸

D. 人参

E. 三颗针根

427. 需要中火炒炭的药材是 (A) 。

A. 槐花

B. 山楂

C. 栀子

D. 荆芥

E. 干姜

428. 炮制后活血通络、祛瘀止痛作用增强的饮片是 (C) 。

A. 酒白芍

B. 盐黄柏

C. 酒当归

D. 生大黄

E. 醋白芍

429. 主含二硫化铁等成分, 且采用煅淬法炮制的是 (C) 。

A. 石决明

B. 石膏

C. 自然铜

D. 牡蛎

E. 赭石

430. 列关于明胶空心胶囊质量要求的说法, 正确的是 (B) 。

A. 干燥失重不得过 15.0%

B. 铬含量不得过百万分之二

C.重金属含量不得过百万分之二十
D.每 10g 供试品中可以检出微量沙
门菌

E.应在 30 分钟内全部溶化或崩解

431.下列药物中适宜作为硬胶囊内容物的是 (E) 。

- A.药物的水溶液或稀乙醇溶液
- B.刺激性强的易溶性药物
- C.易风化的药物
- D.吸湿性强的药物
- E.乳状液型的药物

432.下列物质中适宜作为胶丸填充物的是 (C) 。

- A.低分子量水溶性或挥发性有机物
- B.充填药物的含水量超过 5%
- C.各种油类
- D.醛类
- E.O/W 型乳剂

433.除另有规定外，软胶囊的崩解时限为 (E) 。

- A.10 分钟
- B.45 分钟
- C.30 分钟
- D.2 小时
- E.1 小时

434.下列物质中经常榨汁后作为丸剂润湿剂使用的是 (E) 。

- A.大腹皮
- B.丝瓜络
- C.乳香
- D.竹沥
- E.生姜

435.在蜂蜜炼制过程中，出现“牛眼泡”和“滴水成珠”的是 (A) 。

- A.老蜜
- B.中蜜
- C.嫩蜜
- D.生蜜
- E.巢蜜

436.小建中合剂中的桂枝主要有效成分为挥发油，应采用的提取方法是 (E) 。

- A.煎煮法
- B.回流提取法
- C.渗漉法
- D.连续回流提取法
- E.水蒸气蒸馏法

437.中药饮片用蒸馏酒提取制成的澄清液体制剂是 (B) 。

- A.汤剂
- B.酒剂
- C.煎膏剂
- D.糖浆剂
- E.酏剂

438.因加入量不同，可引起混悬剂中混悬微粒发生絮凝作用或反絮凝作用的物质是（ D ）。

- A.吐温
- B.司盘
- C.海藻酸
- D.酒石酸钠
- E.聚维酮

439.液体制剂的附加剂中，能与水形成潜溶剂的是（ D ）。

- A.羧甲基纤维素钠
- B.枸橼酸盐
- C.苯甲酸钠
- D.甘油
- E.对羟基苯甲酸甲酯

440.在炉甘石洗剂中，作润湿剂的是（ A ）。

- A.甘油
- B.氧化锌
- C.纯化水
- D.炉甘石
- E.羧甲基纤维素钠

441.除另有规定外，口服混悬剂沉降体积比应不低于（ B ）。

- A.0.95
- B.0.90
- C.0.85
- D.0.80
- E.0.75

442.不得添加抑菌剂的眼用制剂是（ E ）。

- A.眼用凝胶剂
- B.眼用乳膏剂
- C.滴眼剂
- D.眼膏剂
- E.眼内注射溶液

443.由纯化水经蒸馏而成，且符合细菌内毒素试验要求的制药用水是（ B ）。

- A.灭菌注射用水
- B.注射用水
- C.饮用水
- D.纯净水
- E.蒸馏水

444.为延长滴眼剂中药液在眼内滞留的时间，可添加（ D ）。

- A.磷酸盐缓冲液
- B.苯乙醇
- C.硼酸
- D.甲基纤维素
- E.三氯叔丁醇

445.配制滴眼剂时，容器的精洗应选用（ D ）。

- A.饮用水
- B.蒸馏水
- C.纯化水
- D.注射用水

E.灭菌注射用水

446.关于注射剂有关规定的说法，错误的是（ C ）。

A.混悬型注射液不得用于静脉注射

B.乳状液型注射液不得用于椎管内注射

C.乳状液型注射液允许出现相分离，但振摇时应分散均匀

D.混悬型注射剂允许有可见沉淀，但振摇时应容易分散均匀

E.注射剂所用辅料中若有抑菌剂，在标签或说明书上应标明抑菌剂的种类及浓度

447.苯甲醇在当归注射液中用作（ C ）。

A.抗氧化剂

B.助悬剂

C.止痛剂

D.抗氧化剂

E. 增溶剂

448.注射给药时，可以使用含抑菌剂的注射液是（ A ）。

A. 皮下注射

B.静脉注射

C. 脑池内注射

D.椎管内注射

E. 硬膜外注射

449.吸入起雾剂中药物的主要吸收部位是（ E ）。

A. 口腔

B.咽喉

C. 气管

D.支气管

E. 肺泡

450.属于温热性所示效用的是（ D ）。

A. 清热

B.泻火

C. 凉血

D.温经

E. 解热毒

二、多选题

1.中药药学服务的重点人群有（ ABDE ）

A.哺乳期妇女

B.用药效果不佳的患者

C.药品消费者

D.肝肾功能不全的患者

E.用药周期长的慢性病患者

2.对肝功能不全患者进行用药指导时要注意(ACDE)

A.明确疾病诊断和治疗目标

- B.慎用有肝毒性的药物
- C.要选择肝毒性小，从肾脏排泄的药物
- D.注意药物相互作用，避免产生新的肝损害
- E.定期检查肝功能，及时调整治疗方案

3.根据中医理论，病、症、证概念不同。下列属于“证”的有(DE)

- A.感冒
- B.中风
- C.四肢不温
- D.气血两虚
- E.肝郁肾虚

4.虚热证，宜采用的治法有(AD)

- A.阳病治阴
- B.阴病治阳
- C.阴中求阳
- D.阳中求阴
- E.扶阳益火

5.根据五行相克规律确定的治法有(CDE)

- A.滋水涵木
- B.培土生金
- C.抑木扶土
- D.培土制水
- E.佐金平木

6.瘀血的致病特点有(ACDE)

- A.疼痛拒按，夜问痛甚
- B.多为刺痛，痛无定处
- C.面色黧黑、肌肤甲错
- D.舌色紫暗或有瘀斑、瘀点
- E.脉细涩、结代或沉弦

7.属于气失调的病机变化有(ABCDE)

- A.气滞
- B.气逆
- C.气陷

D.气脱

E.气虚

8.培养正气, 提高抗病能力的方法有(CDE)

A.控制传变

B.早期诊治

C.精神调养

D.人工免疫

E.锻炼身体,

9.消灭病邪, 防止邪气侵害的方法有(ADE)

A.使用药物

B.人工免疫

C.既病放变

D.防范外伤

E.讲究卫生

10.未病先防的原则和方法有(ABE)

A.重视精神调养

B.注意生活起居

C.控制疾病传变

D.调整阴阳平衡

E.避免病邪侵害

11.根据未病先防的原则, 培养正气, 提高抗病能力的方法有(ABCD)

A.人工免疫预防

B.加强身体锻炼

C.注意生活起居

D.重视精神调养

E.避免病邪侵害

12.根据望面色理论, 青色的临床意义有(ABDE)

A.寒证

B.痛证

C.肾虚证

D.惊风证

E.瘀血证

13.以下关于调气的说法中，正确的有(ABDE)

- A.气滞宜疏
- B.气陷宜升
- C.气逆宜固
- D.气闭宜开
- E.气虚宜补

14.咳嗽属痰热郁肺证，宜选用的中成药是(ABC)

- A.复方鲜竹沥液
- B.清肺化痰丸
- C.清肺抑火丸
- D.通宣理肺丸
- E.橘贝半夏颗粒

15.心悸属阴虚火旺证，宜选用的中成药是(ABCD)

- A.天王补心丸
- B.朱砂安神丸
- C.宁神补心片
- D.安神补心丸
- E.人参归脾丸

16.胸痹属气阴两虚证，宜选用的中成药是(BDE)

- A.心力丸
- B.益心胶囊
- C.心宝丸
- D.洛布桑胶囊
- E.冠心生脉口服液

17.胃痛属寒邪客胃证，宜选用的中成药是(AE)

- A.良附丸
- B.胃安胶囊
- C.槟榔四消丸
- D.舒肝健胃丸
- E.安中片

18.某男,43岁。泄泻腹痛,泻下急迫,泻而不爽,粪色黄褐,气味臭秽,肛门灼热,烦热口渴,小便短黄。舌质红,苔黄腻,脉濡数。宜选

用的中成药是(ABCDE)

- A.痢必灵片
- B.泻痢消胶囊
- C.香连片
- D.连蒲双清片
- E.白蒲黄片

19.虚秘宜选用的中成药是(ABD)

- A.苁蓉润肠口服液
- B.便通胶囊
- C.厚朴排气合剂
- D.苁蓉通便口服液
- E.通幽润燥丸

20.某男，38岁。因饮食不节导致胃痛，症见胃脘疼痛，胀满拒按，噯腐恶食。医师诊断为胃痛，辨证为饮食伤胃证。宜选用的中成药是(ABCD)

- A.加味保和丸
- B.沉香化滞丸
- C.槟榔四消丸
- D.开胸顺气丸
- E.调胃舒肝丸

21.某女，29岁。近日工作不顺，刻下胃脘胀痛，痛连两胁，噯气、矢气则舒，腕闷噯气，善太息。舌淡红，苔薄白，脉弦。宜选用的中成药是(ABCDE)

- A.沉香化气丸
- B.舒肝健胃丸
- C.朴沉化郁丸
- D.舒肝和胃丸
- E.调胃舒肝丸

22.某男，58岁。平素头晕头痛，耳鸣目眩突然发生口眼斜，舌强语謇，半身不遂。舌质红苔黄，脉弦。诊断为中风，辨证为风阳上扰证。宜选用的中成药是(ADE)

- A.松龄血脉康胶囊
- B.消栓胶囊
- C.脑安颗粒

D.全天麻胶囊

E.心脑静片

23.某男, 58 岁。突发一侧腰腹绞痛难忍, 尿中夹有砂石, 排尿涩痛, 少腹拘急。舌质红, 苔薄黄, 脉弦。诊断为淋证, 宜选用的中成药是(CDE)

A.肾炎灵胶囊

B.五淋丸

C.净石灵胶囊

D.五淋化石丸

E.复方金钱草颗粒

24.某男,48 岁。口渴引饮,咽干口燥,多食善饥,倦怠乏力,便溏溲多,形体消瘦。舌质淡红苔白而干,脉弱。诊断为消渴,辨证为气阴两虚证。宜选用的中成药是 (ACE)

A.参精止渴丸

B.麦味地黄丸

C.消渴丸

D.降糖胶囊

E.参芪降糖胶囊

25.某男,38 岁。汗出恶风,稍劳尤甚,易于感冒,体倦乏力,面色少华。舌苔薄白,脉细弱。诊断为汗证,辨证为肺卫不固证,宜选用的中成药是 (ABD)

A.玉屏风颗粒

B.复芪止汗颗粒

C.归脾丸

D.虚汗停颗粒

E.龙胆泻肝丸

26.消渴属脾胃气虚证,宜选用的中成药是 (CE)

A.消糖灵胶囊

B.消渴平片

C.参苓白术散

D.参芪降糖胶袋

E.益津降糖口服液

27.某男, 55 岁。久病体弱,积块坚硬,隐痛,饮食大减,肌肉瘦削,神倦乏力,面色萎黄,甚则面肢浮肿。舌质淡紫,脉细数。诊断为积聚辨证为正虚邪结证。

宜选用的中成药是 (AB)

- A.慢肝养阴胶囊
- B.和络舒肝胶囊
- C.鳖甲煎丸
- D.化痰回生片
- E.逍遥丸

28.胁痛属肝胆湿热证, 宜选用的中成药是 (ACE)

- A.龙胆泻肝丸
- B.元胡止痛片
- C.利胆片
- D.四逆散
- E.胆石清片

29.某女, 44 岁。腰部隐隐作痛, 酸软无力, 劳则加重, 卧则减轻, 伴有耳鸣耳聋, 手足心热, 潮热盗汗, 口燥咽干, 舌红少苔, 脉细数。宜选用的中成药是 (BC)

- A.右归丸
- B.左归丸
- C.七宝美髯丸
- D.豨签丸
- E.桂附地黄丸

30.可以参考痹证辨证论治的西医疾病有 (ABCDE)

- A.风湿性关节炎
- B.痛风
- C.增生性骨关节炎
- D.类风湿关节炎
- E.强直性脊柱炎

31.某女, 27 岁。发热恶寒, 胸闷, 头昏, 身重疼痛, 神疲倦怠。舌质淡, 苔薄黄, 脉弦细。宜选用的中成药是 (ABE)

- A.暑湿感冒颗粒
- B.暑症片
- C.清暑解毒颗粒
- D.暑热感冒颗粒
- E.藿香正气水

32.乳癖属肝郁痰凝证，宜选用的中成药是（ BD ）

- A.乳增宁胶囊
- B.乳康片
- C.活血解毒丸
- D.乳疾灵颗粒
- E.九一散

33.某女，26岁。月经周期提前，量多，色淡红质清稀；神疲乏力，气短懒言，小腹空坠，纳少便溏。舌淡红，苔薄白，脉细弱。宜选用的中成药是（ BE ）

- A.女金丹丸
- B.人参归脾丸
- C.丹栀逍遥丸
- D.益母丸
- E.当归丸

34.某女，29岁。经血量少，色暗红，夹有小血块小腹胀痛不适，经行后痛减，或伴胸胁胀痛腰骶疼痛。舌紫暗，有瘀斑或瘀点，脉沉弦。宜选用的中成药是（ ABCE ）

- A.益母草颗粒
- B.复方益母草膏
- C.加味八珍益母膏
- D.当归丸
- E.调经活血片

35.属于处方前记的有（ ABCD ）

- A. 费别
- B.患者姓名
- C.临床诊断
- D.开具日期
- E.医师签名

36.药师调剂处方时必须做到“四查十对”，以下属于“十对”的内容有（ ABD ）

- A.对姓名
- B.对剂型
- C.对药品
- D.对药名
- E.对配伍禁忌

37.关于中药处方书写要求的说法, 正确的有 (ABCDE)

- A.原则上应当以(g)为单位
- B.应当体现“君、臣、佐、使”的特点要求
- C.对饮片的产地、炮制有特殊要求的, 应当在药品名称之前写明
- D.按毒麻药品管理的中药饮片的使用应严格遵守有关法律、法规和规章的规定
- E.调剂、煎煮的特殊要注明在药品右上方, 并加括号, 如先煎、后下、打碎等

38.处方“焦四仙”应付 (ABDE)

- A.焦神曲
- B.焦山楂
- C.焦谷芽
- D.焦麦芽
- E.焦槟榔

39.处方“全紫苏”应村 (ABD)

- A.紫苏子
- B.紫苏梗
- C.番泻叶
- D.紫苏叶
- E.紫花地丁

40.根据“十八反”的配伍禁忌原则, 不宜与乌头联用的药物有 (ABCE)

- A.天花粉
- B.半夏
- C.瓜蒌皮
- D.西红花
- E.白及

41.宜放在斗架的中上层的药组有 (ABDE)

- A.远志与柏子仁
- B.豆蔻与木香
- C.薄荷与桑叶
- D.葛根与升麻
- E.巴戟天与补骨脂

42.常一起配伍或常用作“药对”, 可以放于同一药斗的有 (ABC)

- A.杜仲、续断

- B.陈皮、青皮
- C.射干、北豆根
- D.大黄炭、黄柏炭
- E.千年健、五加皮

43.根据斗谱编排还应参考的其他原则，因外观性状相似但功效不同，不宜排列在一起的饮片有（ ADE ）

- A.知母与玉竹
- B.天葵子与冬葵子
- C.藜芦与细辛
- D.制南星与象贝
- E.血余炭与干漆炭

44.为防止灰尘污染，宜存放在加盖的瓷罐中的有（ ABE ）

- A.青黛
- B.生蒲黄
- C.罂粟壳
- D.菟丝子
- E.松花粉

45.以下关于中药饮片处方调配复核内容说法正确的有（ ABCDE ）

- A.每剂药的剂量误差应小于± 5%
- B.审查药品质量，保证无伪劣饮片
- C.核对调配好的药品是否与处方所开药味及剂数相符
- D.对于需特殊煎煮的药味如先煎，需复核是否单包并注明用法
- E.调剂复核工作应当由主管药师或执业药师等专业技术人员负责，复核率应当达到100%

46.为保障中药合理用药，执业药师在药学服务过程中宜采取的措施有（ ABCDE ）

- A.选择适宜的给药途径及剂型
- B.正确掌握中成药的剂量及用法
- C.制定合理的用药时间和疗程
- D.参辨患者的身体状况，确认有无药物过敏史
- E.严格遵守配伍禁忌、妊娠禁忌、证候禁忌及服药饮食禁忌等用药禁忌

47.不合理用药的主要表现有（ ABCDE ）

- A.服用时间不当

- B.违反用药禁忌
- C.乱用贵重药品
- D.给药剂量失准
- E.同类重复使用

48.可以黄酒为药引的中成药是 (ABCDE)

- A.云南白药
- B.三七伤药片
- C.大活络丸
- D.再造丸
- E.独活寄生丸

49.不能与麻黄联用的中成药是 (ABCDE)

- A.牛黄降压丸
- B.复方罗布麻片
- C.益心丸
- D.补心气液
- E.心宝丸

50.关于幼儿患者合理用药的说法, 正确的是 (BD)

- A.小儿脏腑娇嫩, 用药不宜过早, 以避免出现药毒
- B.小儿脾气不足, 用药应佐健脾和胃消食导滞之品
- C.小儿外有表邪, 内有火热, 用药以苦寒清热为主, 避免热邪伤津
- D.小儿纯阳之体, 外感病邪易出现惊风用药宜佐平肝息风药
- E.小儿生机旺盛, 易营养不足, 应注意及时予以滋补之品

51.能通鼻窍的药有 (ABCE)

- A.白芷
- B.辛夷
- C.细辛
- D.西河柳
- E.苍耳子

52.秦艽的功效有(ABCE)

- A.祛风湿
- B.清虚热
- C.舒筋络

D.渗湿止泻

E.利湿退黄

53.徐长卿的功效有(ABDE)

A.活血通络

B.祛风止痛

C.化痰止咳

D.止痒

E.解蛇毒

54.能利水的有(ABCD)

A.桑枝

B.五加皮

C.香加皮

D.路路通

E.海风藤

55.吴茱萸的功效有(BCD)

A.温肺化饮

B.散寒止痛

C.疏肝下气

D.燥湿止泻

E.养肝明目

56.小茴香的功效有(AD)

A.理气和胃

B.活血散结

C.杀虫止痒

D.散寒止痛

E.行气止痛

57.下列具有通脉功能的成药有 (ADE)

A.血塞通颗粒

B.参松养心胶囊

C.抗栓再造丸

D.丹七片

E.诺迪康胶囊

58.下列具有益气养阴功能的成药有(ABD)

- A.参松养心胶囊
- B.稳心颗粒
- C.人参再造丸
- D.益心舒胶囊
- E.消栓胶囊

59.养胃舒胶囊的功能有(ADE)

- A.健脾和胃
- B.温肾补精
- C.养血安神
- D.益气养阴
- E.行气导滞

60.既能益气，又能养阴的成药有(BCD)

- A.八珍颗粒
- B.消渴丸
- C.参芪降糖颗粒
- D.生脉饮
- E.玉泉丸

61.六味地黄丸的药物组成有(ABE)

- A.泽泻、茯苓
- B.熟地黄、牡丹皮
- C.枸杞子、菟丝子
- D.龟甲胶、鹿角胶
- E.酒萸肉、山药

62.能治气血两虚的成药有(BDE)

- A.四物合剂
- B.当归补血颗粒
- C.人参固本丸
- D.十全大补丸
- E.八珍颗粒

63.功能宣肺止咳的药物有(ACD)

- A.急支糖浆

- B.强力枇杷露
- C.杏苏止咳颗粒
- D.通宣理肺丸
- E.小青龙颗粒

64.小青龙合剂的药物组成有(ABCDE)

- A.麻黄、桂枝
- B.炙甘草
- C.细辛、干姜
- D.法半夏
- E.五味子、白芍

65.黴哮片的功能有(ABE)

- A.涤痰祛瘀
- B.利气平喘
- C.补肾纳气
- D.止嗽定喘
- E.泻肺除壅

66.桂枝合剂的药物组成有(ABCDE)

- A.生姜
- C.甘草
- B.白芍
- D.大枣
- E.桂枝

67.能治疗风热感冒的成药有(BE)

- A.桂枝合剂
- B.银翘解毒丸
- C.感冒清热颗粒
- D.藿香正气水
- E.双黄连颗粒

68.鼻炎康片与干柏鼻炎片的共同功能有(AC)

- A.清热解毒
- B.芳香化浊
- C.宣肺通窍

D.益气固表

E.消肿止痛

69.车前子的功效有(BCDE)

A.通经下乳

B. 利水通淋

C.渗湿止泻

D.明目

E.清肺化痰

70.大黄的功效有(ABCD)

A.泻下攻积

B.清热泻火

C.解毒止血

D.活血祛瘀

E.泻下软坚

71.白薇的功效有(ABDE)

A.凉血清热

B.退虚热

C.滋阴散结

D.利尿通淋

E.解毒疗疮

72.地骨皮的功效有(ACDE)

A.退虚热

B.活血

C.凉血

D.清肺降火

E.生津

73.某女,28岁。半年前剖腹产一男婴,哺乳至今,准备断奶。昨日因吃麻辣烫与婆婆发生争吵导致胸闷气短,肋肋胀痛,不能选用的药是(ACDE)

A.山楂

B.麦芽

C.稻芽

D.莱菔子

E.神曲

74.某女，35岁。患瘀血所致闭经6个月，近日与朋友聚会吃大量烤肉而致肉积不消，不宜选用的药是(BCDE)

A. 山楂

B.麦芽

C.稻芽

D.莱菔子

E.神曲

75.鸡内金善运脾健胃、消食化积，其主治病证包括(ABCD)

A.食积不消

B.遗精、遗尿

C.肝胆结石

D.小儿疳积

E.气喘咳嗽

76.某女，43岁。气喘咳嗽，近日又因食积气滞导致脘腹胀满，不宜选用的药是(ABCD)

A. 鸡内金

B.神曲

C.金钱草

D. 山楂

E. 莱菔子

77.槟榔的功效包括(ACDE)

A. 消积

B. 止痛

C.截疟

D. 利水

E. 行气

78.榧子的功效包括(ABDE)

A. 杀虫

B. 消积

C.清肺化痰

D.润肠通便

E. 润肺止咳

79.某女，3岁。患绦虫病，近日又见小儿疳积,不宜选用的药是(ABDE)

A. 贯众

B.苦楝皮

C.雷九

D. 南瓜子

E. 鹤草芽

80.某女，28岁。患血滞所致闭经6个月，近日边走路边看手机，不慎跌倒，右手小臂出现瘀滞肿痛，不宜选用的药是(BCDE)

A. 苏木

B.梅花

C.鸡冠花

D. 香附

E.干漆

81.某女，29岁。患月经不调5个月，近日因家庭琐事与婆婆发生争吵而致肝郁胸胁胀痛，不宜选用的药是(BCDE)

A. 月季花

B.红花

C.薄荷

D. 水蛭

E.川芎

82.某女，30岁。患血滞所致闭经6个月，近日又见咳喘、肠燥便秘，不宜选用的药是(BCDE)

A. 桃仁

B.砂仁

C.苦杏仁

D.益母草

E. 王不留行

83.川牛膝的功效包括(ABCD)

A. 逐瘀通经

B. 通利关节

C.利尿通淋

D.引血下行

E.补肝肾

84.虎杖的功效包括(ABCD)

A. 利湿退黄

B. 化痰止咳

C.泻下通便

D.清热解毒

E.通经下乳

85.某女，27岁。患月经不调、痛经2年，近日又患水瘀互阻之水肿，不宜选用的药是(ACDE)

A. 王不留行

B. 益母草

C.牛膝

D.虎杖

E.川牛膝

86.某男，33岁。患风湿痹痛、肢体拘挛3年，近日又患疮疡肿痛，不宜选用的药是(ACDE)

A.益母草

B.没药

C.红花

D.牛膝

E.川牛膝

87.牡蛎的功效包括(ABCD)

A.镇惊安神

C.软坚散结

B.平肝潜阳

D.收敛固涩

E.凉血止血

88.某女，37岁。患肝阳上亢所致头晕目眩2年，近日又患血热气逆所致衄血，不宜选用的药是(BCDE)

A.赭石

B. 朱砂

- C.蒺藜
- D.牡蛎
- E.珍珠母

89.某女，25岁。患风疹瘙痒3年，近日又患肝阳上亢所致头晕目眩，不宜选用的药是(ABDE)

- A. 荆芥
- B.白鲜皮
- C.蒺藜
- D.罗布麻叶
- E.牡蛎

90.大蒜性温，为药食两用之品，其功效包括(ABCD)

- A. 解毒
- B.消肿
- C.杀虫
- D. 止痢
- E.散结

91.猫爪草的功效不包括(BCDE)

- A.化痰散结，解毒消肿
- B.发泡止痛，攻毒杀虫
- C.清热解毒，清肺化痰
- D.蚀疮去腐，劫痰平喘
- E.收湿敛疮，生肌止血

92.某女，25岁。去游泳池被真菌感染而致头癣,近日又与邻居吵架而致胸胁、腕腹胀痛，证属肝气郁滞，不宜选用的药是(ABCD)

- A.香椽
- B.香附
- C.玫瑰花
- D.梅花
- E.川楝子

93.柿蒂味苦，性平。其功效不包括(ABDE)

- A. 开郁醒脾
- B.温肾散寒

- C.降气止呃
- D.和血止痛
- E.行气散结

94.某女，27岁。患寒凝气滞所致脘腹胀痛、痛经半年，近日又见尿频、遗尿，证属肾阳不足，膀胱虚寒，不宜选用的药是(ABCE)

- A.沉香
- B.香附
- C.小茴香
- D.乌药
- E.木香

95.荔枝核能行气散结，祛寒止痛，其主治病证包括(ABCE)

- A.胃脘疼痛
- B.产后腹痛
- C.寒疝腹痛
- D.虫积腹痛
- E.睾丸肿痛

96.佛手和香橼的共同功效包括(ACDE)

- A.疏肝
- B.散结
- C.理气
- D.化痰
- E.和中

97.茜草的功效包括(ABDE)

- A.凉血
- B.止血
- C.养血
- D.祛瘀
- E.通经

98.某女，30岁。近日心悸、失眠，昨日外出露营，不慎被终妈螫伤，不宜选用的药是(ABCE)

- A.地榆
- B.三七

- C.酸枣仁
- D、景天三七
- E、柏子仁

99.某女，20岁。素患月经不调，痛经，外出旅游期间又因衣着不慎而致感冒，医师诊断为邪在少阳寒热往来。不宜选用的药是(BCDE)

- A. 柴胡
- B.升麻
- C.葛根
- D.薄荷
- E. 桑叶

100.某女，40岁。患崩漏经多，白带不止，近日又因装修时亲自为瓷砖美缝而致腰膝酸软。不宜选用的药是(ABDE)

- A. 五加皮
- B.刺五加
- C.鹿衔草
- D. 苦参
- E. 徐长卿

101. 《中国药典》中苦参的质量控制成分是 (AE) 。

- A. 苦参碱
- B. 羟基苦参碱
- C. 苦参烯碱
- D. 安那吉碱
- E. 氧化苦参碱

102. 《中国药典》中山豆根的质量控制成分是 (AD) 。

- A. 氧化苦参碱
- B. 槐果碱
- C. 苦参烯碱
- D. 苦参碱
- E. 槐定碱

103. 氧化苦参碱的结构特点包括 (ABCDE) 。

- A. 具有两个 N 原子
- B. 有喹诺里西啶结构
- C. 具有一个叔胺 N 原子
- D. 具有一个酰胺 N 原子
- E. 是苦参碱的 N-氧化物

104. 《中国药典》中麻黄的质量控制成分是 (BD) 。

- A. 麻黄碱
- B. 盐酸麻黄碱
- C. 伪麻黄碱
- D. 盐酸伪麻黄碱

E. 甲基麻黄碱

105. 下列化合物中，具有挥发性的是（BD）。

A. 氧化苦参碱

B. 麻黄碱

C. 小檗碱

D. 伪麻黄碱

E. 吴茱萸碱

106. 可用于鉴别麻黄碱和伪麻黄碱的是（AD）。

A. 二硫化碳-硫酸铜反应

B. α -萘酚-浓硫酸反应

C. 氨性氯化锶反应

D. 铜络盐反应

E. 三氯化铝反应

107. 麻黄的药理作用包括（ABCDE）。

A. 发汗

B. 平喘

C. 镇咳

D. 解热

E. 抗炎

108. 黄连的药理作用包括（ABCDE）。

A. 抗菌

B. 抗病毒

C. 解热

D. 抗毒素

E. 止泻

109. 《中国药典》中防己的质量控制成分是（AB）。

A. 防己诺林碱

B. 粉防己碱

C. 甲基防己碱

D. 异粉防己碱

E. 防己碱

110. 川乌的药理作用包括（ABCDE）。

A. 镇痛作用

B. 抗炎作用

C. 免疫抑制作用

D. 降压作用

E. 强心作用

111. 下列药材不宜与川乌同用的是（ABCD）。

A. 半夏

B. 瓜蒌

C. 贝母

D. 白蔹

E. 白芍

112. 《中国药典》中天仙子的质量控制成分是（AD）。

A. 莨菪碱

B. 粉防己碱

C. 樟柳碱

D. 东莨菪碱

E. 防己碱

113. 《中国药典》中马钱子的质量控制成分是 (AB) 。

A. 土的宁

B. 马钱子碱

C. 莨菪碱

D. 马钱子毒碱

E. 阿托品

114. 千里光的毒性表现为 (ABD) 。

A. 肝毒性

B. 肾毒性

C. 视神经损害

D. 胚胎毒性

E. 听力损害

115. 雷公藤中生物碱的基本结构为 (AB) 。

A. 倍半萜大环内酯生物碱

B. 精眯类生物碱

C. 有机胺类生物碱

D. 喹诺里西啶类生物碱

E. 吲哚类生物碱

116. 属于对因功效的有 (BCDE) 。

A. 截疟

B. 滋阴

C. 散寒

D. 化瘀

E. 排脓

117. 不属于证名类主治病证的有 (ABCD) 。

A. 增强药物疗效

B. 便于调剂和制剂

C. 改变或缓和药物的性能

D. 提高中药净度, 确保用药质量和剂量

E. 降低或消除药物的毒性或副作用

118. 中药炮制的目的有 (ABCDE) 。

A. 增强药物疗效

B. 便于调剂和制剂

C. 改变或缓和药物的性能

D. 提高中药净度, 确保用药质量和剂量

E. 降低或消除药物的毒性或副作用

119. 可用于中药炮制的固体辅料有 (ABCDE) 。

A. 麦麸

B. 稻米

C. 灶心土

D. 滑石粉

E. 河砂

120. 可用于中药炮制的液体辅料有 (ABCDE) 。

- A. 白萝卜汁
- B. 山羊血
- C. 羊脂油
- D. 石灰水
- E. 吴茱萸汁

121. 皂苷的显色反应有 (ABC) 。

- A. Liebermann-Burchard 反应
- B. 三氯乙酸反应
- C. 五氯化钒反应
- D. 四氢硼钠 (钾) 反应
- E. Feigl 反应

122. 主要含甾体皂苷的中药是 (AD) 。

- A. 麦冬
- B. 柴胡
- C. 合欢皮
- D. 知母
- E. 罗布麻叶

123. 鉴别强心苷甾体母核的反应包括 (ABDE) 。

- A. Salkowski 反应
- B. Liebermann-Burchard 反应
- C. Raymond 反应
- D. 三氯乙酸-氯胺 T 反应
- E. Tschugaev 反应

124. 可以用来区别甲型强心苷和乙型强心苷的反应是 (ABCE) 。

- A. Legal 反应
- B. Raymond 反应
- C. Kedde 反应
- D. K-K 反应
- E. Baljet 反应

125. 跟强心苷的颜色反应有关的因素有 (BDE) 。

- A. 酚羟基
- B. 甾体母核
- C. α -羟基糖
- D. 不饱和内酯环
- E. α -去氧糖

126. 属于强心苷类化合物的是 (ABCDE) 。

- A. 洋地黄毒苷
- B. 杠柳毒苷
- C. 绿海葱苷
- D. 黄夹甘甲
- E. 加拿大麻苷

127. 《中国药典》规定, 牛黄的质量控制成分是 (CD) 。

- A. 去氧胆酸
- B. 牛磺酸
- C. 胆酸
- D. 胆红素
- E. 胆黄素

128. 牛膝的药理作用有 (ABDE) 。

- A. 抗凝血
- B. 抗肿瘤
- C. 解表
- D. 延缓衰老
- E. 增强免疫

129. 属于四环三萜皂苷元类型的是 (AB) 。

- A. 羊毛甾烷型
- B. 达玛烷型
- C. 乌苏烷型
- D. 齐墩果烷型
- E. 羽扇豆烷

130. 关于螺旋甾烷醇和异螺旋甾烷醇类皂苷元的结构特征, 正确的是 (BCDE) 。

- A. 由 30 个碳原子组成
- B. 分子中有 A、B、C、D、E 和 F 六个环
- C. E 环和 F 环以螺缩酮形式连接
- D. 母核为螺旋甾烷结构
- E. 大多数在 C-3 上有羟基

131. 三七的药理作用包括 (ABCDE) 。

- A. 抗心肌缺血
- B. 改善微循环
- C. 抗脑缺血
- D. 扩张血管
- E. 抗动脉粥样硬化

132. 《中国药典》中甘草的质控指标成分为 (AE) 。

- A. 甘草苷
- B. 甘草酚
- C. 甘草素
- D. 甘草次酸
- E. 甘草酸

133. 《中国药典》中以人参皂苷类成分为质控指标 (或之一) 的是 (AE) 。

- A. 人参
- B. 玄参
- C. 苦参
- D. 党参
- E. 三七

134. 《中国药典》中黄芪的含量测定指标成分是 (AD) 。

- A. 黄芪甲苷
- B. 环黄芪醇
- C. 黄芪苷 1
- D. 毛蕊异黄酮葡萄糖苷
- E. 乙酰黄英苷

135. 27. 黄芪的药理作用包括 (ABCD) 。

- A. 增强免疫功能
- B. 扩张外周血管
- C. 改善微循环
- D. 抑制血小板聚集
- E. 止血

136. 《中国药典》中柴胡的含量测定指标成分是 (AD) 。

- A. 柴胡皂苷 a
- B. 柴胡皂苷 b1
- C. 柴胡皂苷 c
- D. 柴胡皂苷 d
- E. 柴胡皂苷 e

137. 中药吴茱萸的原植物有 (ACD) 。

- A. 吴茱萸
- B. 山茱萸
- C. 疏毛吴茱萸
- D. 石虎
- E. 华南吴茱萸

138. 来源于植物种子的中药有 (ABD) 。

- A. 菟丝子
- B. 牵牛子
- C. 女贞子
- D. 马钱子
- E. 牛蒡子

139. 散剂按药物性质分类, 属于特殊散剂的是 (ACD) 。

- A. 九分散
- B. 川贝散
- C. 避瘟散
- D. 蛇胆川贝散
- E. 参苓白术散

140. 软胶囊剂的常用制备方法有 (BD) 。

- A. 乳化法
- B. 滴制法
- C. 泛制法
- D. 压制法
- E. 塑制法

141. 不可用作软胶囊填充材料的有 (BDE) 。

- A. 固体药物
- B. 含醛类药物
- C. 药物的油溶液
- D. 药物的乙醇溶液
- E. 药物的 O/W 型乳剂

142. 芥子炒黄的炮制作用是 (ABCDE) 。

- A. 缓和辛散走窜之性
- B. 避免耗气伤阴
- C. 善于顺气豁痰
- D. 利于粉碎和煎出
- E. 杀酶保苷

143. 山楂炒焦的目的包括 (ACE) 。

- A. 破坏部分有机酸
- B. 使黄酮类化合物含量增高
- C. 缓和对胃的刺激性
- D. 长于活血化瘀
- E. 增强消食止泻的作用

144. 下列叙述正确的是 (ABCDE) 。

- A. 生大蓟以凉血消肿力胜，大蓟炭凉性减弱，收敛止血作用增强
- B. 蒲黄生、炒品均有止血作用，蒲黄炭性涩，止血作用增强
- C. 荆芥具有解表散风的功能，荆芥炭辛散作用极弱，具有止血的功效
- D. 干姜性热偏燥，能守能走，力速而作用较强，故可用于回阳救逆
- E. 姜炭辛味消失，守而不走，长于止血温经

145. 下列关于炒炭炮制方法的叙述，正确的是 (ADE) 。

- A. 炒时用武火或中火
- B. 药物发泡、爆裂
- C. 透出药物固有香味
- D. 炒至“存性”
- E. 药物表面焦黑色或焦褐色，内部呈棕褐色或棕黄色

146. 苍术的炒制方法是 (ABE) 。

- A. 清炒
- B. 麸炒
- C. 土炒
- D. 米炒
- E. 米泔水制

147. 山药加辅料炒的目的是 (ABDE) 。

- A. 土炒山药以补脾止泻为主
- B. 土炒山药用于脾虚久泻
- C. 土炒山药增强补肾生精，益肺肾之阴的作用
- D. 麸炒山药以补脾健胃为主
- E. 麸炒山药用于脾虚食少，泄泻便溏

148. 砂烫马钱子降低毒性、保留药理作用的科学依据是 (DE) 。

- A. 总挥发油含量降低
- B. 总萜醌含量降低
- C. 总黄酮含量降低
- D. 马钱子碱含量降低较多
- E. 土的宁含量降低较少

149. 蛤粉炒制的主要目的是 (ABCD) 。

- A. 使药物质地酥脆
- B. 便于制剂和调剂
- C. 矫正不良气味
- D. 降低药物的滋腻之性
- E. 降低药物毒性

150. 苍术麸炒的作用是 (ABC) 。

- A. 缓和燥性
- B. 增强健脾和胃的作用
- C. 减弱辛味
- D. 增强祛风湿的作用
- E. 增强化湿和胃的作用

第三部分 药物治疗与慢病管理 (100 题)

一、单选题

1.慢性病是慢性疾病的简称,又称为“慢病”。医学上一般将病程超过(A)个月,且不易治愈的疾病视为慢性疾病。

A.3 B.6 C.9 D.12

2.慢性病具有隐蔽性、阶段性、复杂性、可预防性。其中,(C)是慢性病最突出的特点。

A.隐蔽性

B.阶段性

C.复杂性

D.可预防性

3.《中国防治慢性病中长期规划(2017-2025年)》指出,慢性病是严重威胁我国居民健康的一类疾病。我国居民慢性病死亡人数占总死亡人数的比例高达(B),造成的疾病负担已占总疾病负担的(A)以上,已成为影响国家经济社会发展的重大公共卫生问题。

A.70.0%

B.86.6%

C.92.5%

D.95.6%

4.脑血管疾病包括脑血管闭塞引起的脑卒中或血管壁破裂引起的脑出血,俗称中风。脑血管疾病的致残率非常高,(B)的脑血管疾病患者会出现功能障碍或残疾,约 50%的患者生活不能自理。

A.50%~60%

B.60%~70%

C.65%~75%

D.70%~80%

5.通过对慢性病发病率上升的诸多疾病流行病学原因分析,揭示慢性病主要危险因素是(D),它是一种可控因素,对慢性病的发病率影响大

A.遗传因素

B.社会因素

C.气候因素

D.个人不良生活方式

6.保持膳食品种多样化,控制总能量的摄入,严格控制富含高能量的动物性脂肪和蛋白质的摄入量,WHO建议每人每日小于(C)

A.4g B.5g C.6g D.7g

7.中等量饮酒的定义为:男性每天饮酒量不超过()g酒精(2个标准饮酒量),相当于1瓶啤酒、1两白酒或250mL葡萄酒;女性每天饮酒量不超过()g酒精(1个标准饮酒量),相当于半瓶啤酒、半两白酒或125mL葡萄酒。(A)

A.28、14

B.38、19

C.48、24

D.68、34

8.不属于药物治疗管理(MTM)服务的核心组成部分的是(D)

A.药物治疗审核 B.药物治疗计划

C.干预和/或转诊 D.与患者家人建立有效沟通

9.药物治疗管理(MTM)是优化患者()的服务。(C)

A.疾病诊断 B.康复管理

C.药物治疗结果 D.药物治疗费用

10.药物治疗管理(MTM)药师进行药物治疗管理的随访过程中,以下做法不恰当的是(D)

A.如果治疗目标未达到,应当继续鼓励患者

B.如果新的MRP出现,可以就该问题进行专项MTM

C.前来MTM复诊之前,提醒患者提前完成相关的实验室检查等

D.鼓励患者未转诊至医生而自行调整处方药

11.对于低健康素养的患者,药师在进行交流过程中可采取一定的策略,不包括(D)

A.请患者复述和解释药师交代的内容

B.使用开放式的问题

C.提供教育材料,包括大量可视教材

D.尽量使用专业术语

12.药师在进行药物治疗管理时,发现患者同时服用的两种药物存在药动学相互作用,导致其中一种药物血药浓度显著升高,首先应采取的措施是?(B)

A.立即让患者停用这两种药物

- B. 查阅权威资料或咨询临床药师，评估风险并提出调整建议
- C. 告知患者不用担心，继续按原方案服药
- D. 自行调整药物剂量继续使用

13.对于肝功能不全的患者进行药物治疗管理，选择药物时应优先考虑？（C）

- A. 药物的价格
- B. 药物的品牌
- C. 药物的肝毒性及代谢途径
- D. 药物的剂型

14.以下哪种情况不属于药物治疗管理中需要重点关注的药物治疗问题？（D）

- A. 药物剂量不足，未达到有效治疗浓度
- B. 存在药物过敏史却使用相关致敏药物
- C. 多种药物联合使用导致的严重不良反应
- D. 药品包装出现轻微破损

15.患者正在使用华法林进行抗凝治疗，药师在药物治疗管理中，应告知患者避免大量食用的食物是？（A）

- A. 绿色蔬菜
- B. 牛奶
- C. 苹果
- D. 米饭

16.药师审核处方时，发现处方药物与患者当前正在使用的某 OTC 药物存在潜在相互作用，正确的做法是？（C）

- A. 忽视 OTC 药物，按处方正常调配
- B. 告知患者停用 OTC 药物，无需进一步处理
- C. 与处方医生沟通，确认是否需要调整治疗方案
- D. 让患者自行决定是否继续使用 OTC 药物

17.糖尿病患者药物治疗管理期间，使用胰岛素治疗后出现体重增加明显，药师应首先考虑？（B）

- A. 建议患者增加运动量，无需调整药物
- B. 评估胰岛素剂量是否过大，是否存在低血糖后的代偿性进食
- C. 直接更换胰岛素剂型
- D. 告知患者这是正常现象，不用在意

18.老年患者同时患有高血压、糖尿病和高血脂，正在服用多种药物，药师进行药物治疗管理时，重点关注的内容不包括？（D）

- A. 药物之间的相互作用
- B. 患者的肝肾功能能否耐受这些药物
- C. 患者是否能正确理解并执行复杂的用药方案
- D. 药品的生产厂家是否知名

19.在药物治疗管理中，评估患者用药依从性的最直接有效方法是？（C）

- A. 观察患者的外貌特征
- B. 分析患者的经济状况
- C. 直接询问患者服药情况并结合药品剩余量检查
- D. 监测患者的生命体征

20.患者使用某抗生素治疗感染，用药 3 天后症状未缓解，药师在药物治疗管理中应首先？（A）

- A. 协助医生评估是否为细菌耐药、药物选择不当或用药剂量不足等原因
- B. 建议立即更换抗生素
- C. 增加现有抗生素的使用剂量
- D. 告知患者继续观察，无需特殊处理

21.药师为患者制定药物治疗干预计划时，最重要的依据是？（B）

- A. 药店的药品库存情况
- B. 患者具体的药物治疗问题和治疗目标
- C. 药品的促销活动
- D. 药师的个人经验

22.对于服用地高辛的心力衰竭患者，药师在药物治疗管理中，应重点监测的指标是？（C）

- A. 血尿酸
- B. 血糖
- C. 血药浓度及心率、心律
- D. 血红蛋白

23.患者在药物治疗期间出现药物不良反应，药师进行处理时，错误的做法是？（D）

- A. 详细记录不良反应的表现、发生时间等信息
- B. 评估不良反应的严重程度
- C. 与医生沟通，提出调整药物治疗方案的建议
- D. 立即停药

D. 让患者自行购买其他药物缓解不良反应

24.在药物治疗管理流程中, 药物治疗评估不包括以下哪项内容? (D)

- A. 评估药物治疗的有效性
- B. 评估药物治疗的安全性
- C. 评估药物治疗的经济性
- D. 评估患者的家庭关系

25.药师发现患者长期使用糖皮质激素, 未采取预防骨质疏松的措施, 应建议? (B)

- A. 立即停用糖皮质激素
- B. 补充钙剂和维生素 D, 必要时使用抗骨质疏松药物
- C. 增加糖皮质激素剂量以抵消副作用
- D. 无需特殊处理

26.患者使用降压药后出现干咳副作用, 药师在药物治疗管理中应推荐的替代药物是? (C)

- A. 同类型其他降压药
- B. 止咳药物
- C. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- D. 抗生素

27.药物治疗管理中, 对患者进行用药教育时, 关于用药时间的描述, 错误的是? (D)

- A. 一般肠溶片宜饭前服用
- B. 大多数降糖药需在餐前服用
- C. 他汀类药物建议晚上睡前服用
- D. 所有药物都可以在餐后立即服用

28.药师为肾功能不全患者调整药物剂量时, 最可靠的依据是? (B)

- A. 患者的年龄
- B. 患者的肾小球滤过率 (GFR) 或肌酐清除率
- C. 患者的体重
- D. 药品说明书上的常规剂量

29.高血压患者服用 β 受体阻滞剂期间突然停药, 可能导致? (A)

- A. 血压反跳性升高, 心绞痛发作
- B. 血压持续降低
- C. 血糖降低

D. 血脂异常

30.患者在药物治疗管理期间，需要进行手术，药师应协助医生？ (C)

- A. 让患者立即停用所有正在服用的药物
- B. 增加药物剂量以应对手术应激
- C. 评估哪些药物需要在手术前停用、调整或继续使用
- D. 无需特殊处理，按原方案用药

31.药师对患者的药物治疗方案进行重整时，不包括以下哪项操作？ (D)

- A. 收集患者当前使用的所有药物信息
- B. 核对药物与诊断的相符性
- C. 检查药物剂量、剂型、用法的正确性
- D. 为患者购买新的药物

32..老年人是 MTM 服务的主要人群，因此药师必须熟悉老年人的特殊需要，不包括(D)

- A.药物剂量调整
- B.老年疾病特点
- C.关注重复用药
- D.老年人家庭情况

33.糖尿病患者使用胰岛素治疗，若注射部位出现脂肪萎缩，应？ (C)

- A. 继续在原部位注射
- B. 加大注射剂量
- C. 更换注射部位，采用正确的轮换方法
- D. 热敷萎缩部位

34.慢性阻塞性肺疾病患者使用糖皮质激素吸入剂治疗，长期使用可能出现的不良反应是？ (D)

- A. 血压降低
- B. 血糖降低
- C. 心率减慢
- D. 骨质疏松**

35.高血压合并痛风患者，首选的降压药物是？ (答案：B)

- A. 氢氯噻嗪
- B. 氯沙坦钾
- C. 美托洛尔
- D. 硝苯地平

36.下列药物中，属于短效胰岛素的是？ (A)

- A. 普通胰岛素
- B. 甘精胰岛素
- C. 地特胰岛素
- D. 门冬胰岛素

37.以下哪种情况会降低降压药物的疗效？ (A)

- A. 高血压患者长期高盐饮食
- B. 每日固定时间服药
- C. 定期监测血压并记录
- D. 保持规律作息

38.老年高血压患者同时服用氨氯地平和美托洛尔，药师应重点监测？ (C)

- A. 尿酸水平
- B. 肝功能指标
- C. 心率及血压
- D. 血糖变化

39.慢性肾脏病 (CKD) 患者使用促红细胞生成素治疗贫血时，必须同时补充？ (C)

- A. 维生素 C
- B. 维生素 D
- C. 铁 剂
- D. 维生素 B12

40.哮喘患者使用 β_2 受体激动剂后，出现手抖症状，主要原因是？ (D)

- A. 药物过敏
- B. 剂量不足
- C. 合并神经系统疾病
- D. β_2 受体激动剂对骨骼肌 β_2 受体的兴奋作用

二、多选题

41.根据疾病的病因和疾病防治管理，慢性病分为 (AB) 两大类。

- A.慢性非传染性疾病
- B.慢性传染性疾病
- C.心脑血管疾病
- D.呼吸系统疾病

42.慢性非传染性疾病是指具有 (ABCD) 的一类疾病。

- A.非传染性
- B.慢性表现
- C.不能自愈
- D.几乎不能被治愈

43.慢性非传染性疾病特点是 (ABCD)

- A.发病率高
- B.致残率高
- C.死亡率高
- D.医疗费用高

44.慢性病疾病谱以心脑血管疾病、呼吸系统疾病、内分泌代谢疾病和各种癌症为主，如 (ABCDE)，也包括运动系统慢性疾病 (如颈椎病、腰椎病、骨关节病)，以及口腔疾病、皮肤病、疼痛和精神疾病等。

- A.高血压
- B.糖尿病
- C.脑卒中
- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.哮喘及各种恶性肿瘤

45.以下哪些属于药理学方面的药物相互作用？ (ABC)

- A. 一种药物影响另一种药物的吸收
- B. 药物之间相互影响在肝脏的代谢
- C. 药物之间相互影响在肾脏的排泄
- D. 两种药物合用增强或减弱药效

46.慢性病的病变特点包括 (ABCDE)

- A.病程早期常发展缓慢，初期无明显临床症状
- B.病理生理过程影响因素众多，且错综复杂
- C.病程难以预计，往往内部急剧恶化，表面平静，症状缺乏典型性
- D.迁延难愈，明显影响患者生活及生存质量
- E.发病及进展多与不良的生活方式、精神卫生密切相关

47.对于糖尿病患者的药物治疗管理，药师应关注的内容包括？ (ABCD)

- A. 降糖药物的选择、剂量和用法
- B. 胰岛素的储存、注射方法及注意事项
- C. 药物治疗的效果及血糖监测结果

D. 药物不良反应，如低血糖、体重变化等

48.慢性病的危害主要为 (ABD)。

A.死亡率高

B.致残率高

C.间接引发其它疾病

D.卫生经济负担重

49.WHO 提出人类健康的基石包括 (ABCD)，它们是慢性病一级预防的基本原则

A.合理膳食

B.适量运动

C.戒烟限酒

D.心理平衡

50.二级预防亦称“三早”预防，“三早”即 (ABC)，是防止或减缓疾病发展而采取的有效措施。

A.早发现

B.早诊断

C.早治疗

D.早预防

51.药物治疗管理中，提高患者用药依从性的措施有？ (ABCD)

A. 简化用药方案，减少服药种类和次数

B. 提供用药提醒工具，如药盒、手机提醒等

C. 加强用药教育，让患者了解用药的重要性

D. 定期随访，及时解决患者用药过程中的问题

52.慢性病的健康管理对象主要包括 (ABC)

A.疾病管理

B.患者管理

C.环境管理

D.心理健康管理

53.患者在药物治疗期间出现药物不良反应，药师处理的步骤包括？ (ABCD)

A. 详细询问患者不良反应的表现、发生时间、严重程度等

B. 查阅资料，判断不良反应与药物的相关性

C. 与医生沟通，提出调整药物治疗方案的建议

D. 跟踪随访患者，了解不良反应的转归情况

54.世界卫生组织确定的合理用药标准（ABCDE）

- A. 药物正确无误
- B. 疗效、安全性、使用、价格对患者适宜
- C. 剂量、用法、疗程妥当
- D. 用药对象适宜、无禁忌证、不良反应小；
- E. 调配无误

55.以下哪些情况可能导致高血压患者血压控制不佳？（ABC）

- A. 未按医嘱规律服药，随意漏服或自行停药
- B. 同时服用影响降压药疗效的其他药物，如含麻黄碱的止咳药
- C. 持续处于高盐饮食、精神紧张、缺乏运动等不良生活方式
- D. 每日坚持测量血压并记录

56.糖尿病患者在使用胰岛素治疗过程中，出现低血糖反应时，可能的症状包括？

（答案：ABCD）

- A. 心慌、手抖、出汗
- B. 饥饿感明显
- C. 头晕、乏力，甚至意识模糊
- D. 面色苍白、心跳加快

57.药师在药物治疗管理中，处理药物相互作用的措施有？（ABCD）

- A. 查阅资料，评估相互作用的类型和严重程度
- B. 与医生沟通，调整药物治疗方案
- C. 告知患者相互作用的风险及注意事项
- D. 必要时监测血药浓度或相关指标

58.在药物治疗管理流程中，药物治疗评估的内容包括？（ABC）

- A. 评估药物治疗是否达到预期目标
- B. 评估药物治疗方案的安全性和耐受性
- C. 评估药物治疗的经济性，是否符合成本 - 效益原则
- D. 评估患者的社会支持系统

59.对于合并多种慢性病（如高血压、糖尿病、高血脂）的老年患者，药店药师在进行药物治疗管理时，应重点关注？（BCD）

- A. 药品的品牌知名度
- B. 药物之间的相互作用，避免重复用药或不良反应叠加

- C. 患者的肝肾功能，调整药物剂量或选择肾毒性小的药物
- D. 患者的用药依从性，简化用药方案或提供用药提醒工具

60. 下列关于他汀类药物的使用注意事项，正确的是？ (ABD)

- A. 建议晚上睡前服用，因胆固醇合成高峰期在夜间
- B. 用药期间需定期监测肝功能和肌酸激酶（CK）水平
- C. 出现轻微肌肉疼痛可自行加大剂量，增强疗效
- D. 与葡萄柚汁同服会增加药物浓度，应避免

61. 药师对患者的药物治疗方案进行重整时，主要工作有？ (ABCD)

- A. 对比患者当前用药与既往用药的差异
- B. 检查药物治疗的合理性，如剂量、疗程等
- C. 发现并解决潜在的药物治疗问题
- D. 优化药物治疗方案，提高治疗效果

62. 药店为糖尿病患者提供用药指导时，关于胰岛素笔的使用方法，正确的教育内容有？ (ACD)

- A. 每次注射前需检查胰岛素的剂型、有效期和外观
- B. 为节省成本，针头可重复使用多次
- C. 注射部位应定期轮换，避免同一部位反复注射
- D. 注射完毕后，应停留 10 - 15 秒再拔出针头，确保药物完全注入

63. 以下哪些属于药物治疗管理 (MTM) 中对患者用药效果的评估指标？ (ABC)

- A. 临床症状改善情况，如心绞痛发作频率降低、血糖控制平稳
- B. 实验室检查指标，如血脂、血压、糖化血红蛋白达标
- C. 患者生活质量提升，如活动耐力增强、并发症减少
- D. 药店药品销售额的变化

64. 药师在药物治疗管理中，针对特殊人群（如孕妇、儿童）的用药指导，正确的是？ (ABCD)

- A. 告知孕妇哪些药物可能对胎儿产生不良影响
- B. 为儿童选择合适的剂型和剂量，避免使用可能影响生长发育的药物
- C. 强调特殊人群用药的重要性和注意事项
- D. 定期随访，评估用药效果和安全性

65. 冠心病患者在日常生活中，为预防心绞痛发作，应采取的措施有？ (ABD)

- A. 避免剧烈运动、情绪激动、寒冷刺激等诱发因素
- B. 随身携带硝酸甘油，并定期检查药物有效期

- C. 长期大量服用抗生素预防感染
- D. 保持规律作息，戒烟限酒，控制体重

66.以下哪些药物与食物存在相互作用，药师在药物治疗管理中需要告知患者？(ABCD)

- A. 服用头孢类抗生素期间禁止饮酒（双硫仑样反应）
- B. 他汀类药物避免与大量葡萄柚汁同服
- C. 华法林避免与富含维生素 K 的食物大量同服
- D. 服用铁剂时避免与浓茶同服

67.药师为患者制定药物治疗干预计划时，应考虑的因素有？(ABCD)

- A. 患者的疾病状况和治疗目标
- B. 患者的个体差异（如年龄、性别、肝肾功能等）
- C. 药物的特性（疗效、安全性、相互作用等）
- D. 患者的经济状况和药品可获得性

68.药店开展慢病管理时，为提高患者用药依从性，可采取的措施有？(BCD)

- A. 强制患者购买指定品牌药品
- B. 提供用药清单，明确标注药物名称、剂量、服用时间和方法
- C. 定期电话或微信随访，提醒患者按时服药和复诊
- D. 开展用药知识讲座，解答患者疑问，增强其对疾病和药物的认识

69.对于心血管疾病患者的药物治疗管理，涉及的常用药物类别有？(ABCD)

- A. 降压药
- B. 调脂药
- C. 抗血小板药
- D. 抗心律失常药

70.慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者急性发作期，可能的诱因包括？(ABC)

- A. 呼吸道感染，如病毒、细菌或支原体感染
- B. 天气变化、寒冷刺激导致气道痉挛
- C. 未规律使用吸入药物，导致病情控制不佳
- D. 每日坚持进行呼吸功能锻炼

71.药师在为慢病患者制定药物治疗方案时，应遵循的原则有？(ABC)

- A. 有效性：选择能有效控制病情的药物
- B. 安全性：评估药物不良反应，避免严重风险
- C. 经济性：在同等疗效下，优先选择价格合理的药物

D. 新药优先：无论病情如何，均推荐最新上市药物

72.高血压患者在测量血压时，为保证结果准确，应注意？（ABC）

- A. 测量前静坐休息 5 - 10 分钟，避免剧烈运动、吸烟、饮酒
- B. 使用合适的袖带，袖带应紧贴皮肤，下缘距肘窝 2 - 3cm
- C. 测量时保持手臂与心脏处于同一水平，采用坐位或卧位
- D. 只测量一次即可，多次测量会导致结果不准确

73.糖尿病患者的足部护理措施，正确的有？（ABD）

- A. 每天用温水（不超过 37°C）洗脚，避免使用刺激性肥皂
- B. 洗脚后及时擦干，特别是脚趾间，防止潮湿滋生细菌
- C. 自行修剪趾甲时，尽量剪短，避免甲沟炎
- D. 选择合适的鞋袜，鞋子应宽松、透气，袜子避免过紧

74.药师在药物治疗管理中，与医生沟通的主要目的包括？（ABCD）

- A. 交流患者的病情和治疗进展
- B. 确认处方药物的合理性和安全性
- C. 共同探讨复杂病例的药物治疗方案
- D. 反馈患者用药过程中出现的问题和建议

75.药物治疗管理中，常见的药物治疗问题包括？（ABCD）

- A. 药物不良反应
- B. 药物相互作用
- C. 用药剂量不合理
- D. 患者用药依从性差

76.药店药师在进行药物重整时，需对比的内容包括？（ABCD）

- A. 患者目前正在使用的药物与既往用药史是否一致
- B. 处方药物与诊断是否相符，是否存在无适应证用药
- C. 药物剂量、剂型、用法是否正确，有无重复用药
- D. 药物之间是否存在相互作用或配伍禁忌

77.慢性心力衰竭患者使用利尿剂期间，应重点监测的指标有？（AB）

- A. 血钾水平，防止低钾或高钾血症
- B. 尿量和体重变化，评估利尿效果
- C. 血糖水平（利尿剂一般不影响血糖）
- D. 血尿酸水平（部分利尿剂可能影响，但非首要监测指标）

78.糖尿病患者外出旅行时，关于胰岛素的保存和使用，正确的做法是？（ABC）

- A. 使用保温袋或胰岛素专用冷藏盒携带，避免高温和冷冻
- B. 随身携带胰岛素和注射用品，避免托运导致丢失或温度异常
- C. 调整饮食和运动计划时，需相应调整胰岛素剂量
- D. 已开封的胰岛素可随意放置在车内或行李中

79.药师在对慢病患者进行用药教育时，可采用的有效方式有？（ABC）

- A. 制作图文并茂的用药手册，标注关键信息
- B. 利用视频演示正确的用药操作，如胰岛素注射、吸入剂使用
- C. 组织小组讨论，让患者分享用药经验和问题
- D. 仅口头告知一次，不进行重复和确认

80.以下哪些情况可能影响他汀类药物的疗效？（BCD）

- A. 每日固定时间服药
- B. 同时服用肝药酶抑制剂（如伊曲康唑、红霉素）
- C. 未控制饮食，仍大量摄入高脂食物
- D. 患者存在严重肝肾功能不全

81.高血压患者在用药过程中，出现以下哪些症状需立即就医？（ACD）

- A. 血压急剧升高，超过 180/110mmHg，伴头痛、视力模糊
- B. 轻微头晕，休息后缓解
- C. 出现呼吸困难、心悸，可能并发心力衰竭
- D. 肢体麻木、无力，言语不清，警惕脑卒中发生

82.慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者进行呼吸功能锻炼的方法包括？（ABD）

- A. 缩唇呼吸：闭嘴经鼻吸气，然后缩唇缓慢呼气
- B. 腹式呼吸：吸气时腹部隆起，呼气时腹部下陷
- C. 快速深呼吸，每分钟呼吸频率 > 30 次
- D. 呼吸操：结合肢体运动进行呼吸训练

83.对于同时患有糖尿病和高血脂的患者，饮食控制的要点有？（ABC）

- A. 限制饱和脂肪酸和反式脂肪酸摄入，如动物油、油炸食品
- B. 控制碳水化合物总量，选择低升糖指数（GI）食物
- C. 增加膳食纤维摄入，如蔬菜、全谷物、豆类
- D. 可随意食用含糖量高的水果

84.药师在审核处方时，发现以下哪些情况属于不合理用药？（ABC）

- A. 老年患者使用地西洋剂量过大，增加跌倒风险
- B. 青霉素类药物开具前未询问患者过敏史

- C. 处方中两种药物作用相同，存在重复用药
- D. 患者因病情需要联合使用多种药物

85.糖尿病患者运动治疗的注意事项包括？ (ABD)

- A. 运动前进行血糖监测，血糖过高 (> 16.7mmol/L) 或过低 (< 3.9mmol/L) 不宜运动
- B. 选择合适的运动时间，一般建议餐后 1 - 2 小时运动
- C. 运动强度越大越好，可快速降低血糖
- D. 运动过程中随身携带含糖食物，以防低血糖发生

86.药物治疗管理中，对患者进行用药教育的内容应包括？ (ABCD)

- A. 药物的作用、用法用量和疗程
- B. 药物的不良反应及应对方法
- C. 漏服、多服药物的处理方式
- D. 用药期间的饮食、生活注意事项

87.药店在为慢病患者服务时，保护患者隐私的措施有？ (ABC)

- A. 在单独的咨询室进行用药指导，避免他人旁听
- B. 未经患者同意，不向第三方透露患者的疾病信息和用药记录
- C. 电子档案设置访问权限，仅限相关工作人员查阅
- D. 随意将患者信息用于商业推广

88.慢性肾脏病患者的饮食原则包括？ (ABD)

- A. 优质低蛋白饮食，减少肾脏负担，如选择鸡蛋、牛奶、瘦肉
- B. 限制钠摄入，避免水肿和高血压加重
- C. 大量摄入植物蛋白，如豆制品
- D. 根据肾功能情况，适当补充维生素和矿物质

89.药师发现患者存在药物滥用风险 (如过度使用镇痛药)，可采取的干预措施有？ (ABC)

- A. 与患者沟通，了解用药原因，提供合理用药建议
- B. 联系医生，调整处方药物种类或剂量
- C. 推荐非药物镇痛方法，如物理治疗、心理疏导
- D. 默许患者行为，不进行干涉

90.冠心病患者服用硝酸甘油时，错误的做法有？ (CD)

- A. 舌下含服，不可吞服
- B. 若 5 分钟后症状不缓解，可重复含服 1 片，最多含服 3 片

- C. 含服时采取平卧位，防止头晕
- D. 药物过期后继续使用，认为不影响疗效

91.高血压患者在夏季血压降低时，正确的处理方式是？ (BC)

- A. 立即自行停药，等血压升高再服药
- B. 密切监测血压变化，记录测量值
- C. 咨询医生或药师，在指导下调整用药剂量
- D. 随意更换降压药物品牌

92.糖尿病患者自我血糖监测的频率可根据以下哪些因素调整？ (ABC)

- A. 血糖控制情况，波动大时需增加监测次数
- B. 治疗方案，使用胰岛素者比口服药者监测更频繁
- C. 生活方式改变，如运动、饮食调整期间
- D. 天气变化情况

93.药店在开展慢病管理过程中，与医疗机构合作的意义在于？ (ABC)

- A. 共享患者病历信息，全面了解病情
- B. 协助医生进行患者随访和用药指导，提高治疗效果
- C. 及时获取专业支持，解决复杂用药问题
- D. 与医院竞争患者资源

94.对于老年慢病患者，药物治疗管理的特殊关注点有？ (ABC)

- A. 多重用药问题，避免药物相互作用和不良反应
- B. 认知功能下降，可能影响用药依从性，需简化方案
- C. 肝肾功能减退，调整药物剂量，避免蓄积中毒
- D. 无需考虑药物价格，选择最贵的药物

95.药物治疗管理的目标包括？ (ABC)

- A. 优化药物治疗方案，提高治疗效果
- B. 减少药物不良反应和药物相互作用的发生
- C. 提高患者的用药依从性
- D. 单纯增加药店的药品销售额

96.药师在进行药物治疗管理时，收集患者信息应包括？ (ABCD)

- A. 基本信息（姓名、年龄、联系方式等）
- B. 疾病史（包括现患疾病和既往病史）
- C. 用药史（当前使用药物及既往用药情况）
- D. 过敏史（药物、食物等过敏情况）

97.以下哪些情况可能导致药物治疗失败？（ABCD）

- A. 药物选择不当，未针对病因或病情
- B. 用药剂量不足或过大
- C. 患者未按医嘱规律服药，依从性差
- D. 存在药物相互作用，影响药效

98.对于老年患者的药物治疗管理，应特别关注的问题有？（ABCD）

- A. 多重用药导致的药物相互作用风险增加
- B. 肝肾功能减退，药物代谢和排泄能力下降
- C. 记忆力减退，可能影响用药依从性
- D. 对药物副作用的耐受性降低

99.药师在审核处方时，发现以下哪些情况属于不合理用药？（ABCD）

- A. 无适应证用药
- B. 药物剂量超出正常治疗范围
- C. 存在重复用药现象
- D. 药物之间存在严重的相互作用

100.在药物治疗管理中，评估药物治疗有效性的指标有？（ABC）

- A. 临床症状的改善，如疼痛缓解、咳嗽减轻
- B. 实验室检查指标的变化，如血糖、血压、血脂达标
- C. 疾病相关的功能改善，如心力衰竭患者活动耐力增强
- D. 患者的心理状态是否良好